Leu+Gygax AG

Buschbohnen

WF = Wartefrist in Tagen

Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.

Einjährige Ungräser	**Agil**	1 l/ha	28	
Vorauflauf und Nachauflauf Unkräuter und Ungräser (speziell Amarant und Nachtschatten)	**Bolero**	1 l/ha		Nachauflauf mischbar mit Effican SG. Splitbehandlung mit 2 x 0,5 l/ha möglich.
Einjährige Unkräuter	**Effican SG**	2 x 0,4 kg/ha		Im Keimblatt oder Unkräuter. Splitbehandlung: nicht bei Hitze und nur auf abgetrocknete Bestände spritzen. **(GWS)**
Einjährige Gräser und Unkräuter	**Frontier X2**	1,2-1,4 l/ha		Vorauflauf
Einjährige Gräser und Unkräuter	**Caravel** **+ Frontier X2**	0,25 l/ha 0,9 l/ha		Vorauflauf unmittelbar bis 2 Tage nach der Saat.
Bohnenrost, Brennflecken	**Flint** 0,04 %	400 g/ha	3	Bei Befallsbeginn. BBCH 13-79. Im Gewächshaus.
Bohnenbrand, Fettfleckenkrankheit	**Flowbrix** BIO	2 l/ha	21	1. Behandlung bei Befallsbeginn, regelmässige Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. Hochwertiges Kupferpräparat.
	Kupfer Bordo LG BIO	4 kg/ha	21	
	Cuproxat flüssig BIO	4 l/ha	21	
	Switch	0,5-0,8 kg/ha	14	Max. 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.
Braunfleckenkrankheit, Brennfleckenkrankheit, Falscher Mehltau, Sclerotinia-Fäule	**Diagonal**	1 l/ha	14	Max. 3 Behandlungen pro Kultur.
Blattläuse	**Pirimor**	0,5 kg/ha	7	Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen. Maximal 2 Behandlungen mit diesem Wirkstoff. **(GWS)**
Blattläuse, Erdraupen, Minierfliegen, Erbsenblattrandkäfer, Thripse	**Techno 10 CS**	0,1 l/ha	7	Mit Sonderbewilligung. **(GWS)**
Eulenraupen	**XenTari** BIO TEAM BF	1 kg/ha	3	
Blattläuse, Thripse	**Siltac plus** TEAM BF	0,1 l/ha		Auf gute Benetzung achten.
Blattläuse, Weisse Fliegen	**Piretro Verde** BIO	2,5 l/ha	3	**(GWS)**
Weisse Fliegen	**Vista** BIO TEAM BF	20 l/ha		
Wachstumsförderung	**HBR** TEAM BF	1 l/ha		Bei frühen Kulturen gegen Kältestress.

Fenchel

Einjährige Gräser und Unkräuter	**Laguna**	2 l/ha	90 70	gesät gepflanzt
Unkräuter, Ungräser	**Pendi**	2-4 l/ha		Unmittelbar nach der Saat oder vor der Pflanzung. Leichte Böden untere Dosierung.
Einjährige Ungräser	**Agil**	1 l/ha	28	
Einjährige Gräser und Unkräuter	**Caravel**	0,25 l/ha	60	gesät: Vorauflauf bis 2 Tage nach Saat. gepflanzt: Unmittelbar nach Pflanzung
Cercospora und Ramularia, Blattfleckenkrankheit	**Bogard**	0,5 l/ha	14	Ab Befallsbeginn. Max. 3 Behandlungen pro Parzelle/Jahr. **(GWS)**
Cercospora und Ramularia, Blattfleckenkrankheit, Falscher Mehltau der Doldenblütler	**Diagonal**	1 l/ha	7	Max. 3 Behandlungen pro Kultur.
Falscher Mehltau der Doldenblütler	**Revus** **+ Quiz** BIO TEAM BF	0,6 l/ha 1 l/ha	14	Max. 3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.
Blattläuse, Erdraupen, Minierfliegen, Möhrenblattfloh, Möhrenfliegen, Thripse	**Techno 10 CS**	0,1 l/ha	14	Mit Sonderbewilligung. **(GWS)**
Blattläuse, Thripse	**Siltac plus** TEAM BF	0,1 l/ha		Auf gute Benetzung achten.
Blattfressende Raupen, Erdraupen, Eulenraupen (blattfressend), Minierfliegen, Thripse	**Audienz** BIO	0,2 l/ha	7	3 Behandlungen pro Kultur im Abstand von mind. 7 Tagen.
Blattläuse, Weisse Fliegen	**Piretro verde** BIO	2,5 l/ha	3	Max. 4 Behandlungen im Abstand von mind. 7 Tagen.
Eulenraupen (blattfressend)	**XenTari** BIO TEAM BF	1 kg/ha	3	Nicht bei kaltem Wetter einsetzen. Nur gegen junge Larvenstadien.
Wachstumsförderung	**HBR** TEAM BF	1 l/ha		Bei frühen Kulturen gegen Kältestress.
Bormangel	**Micro Bor** BIO TEAM BF	1-3 l/ha		Bei Bedarf wiederholen.
Calcium- und Spurenelementmangel	**Basfoliar Combi** STIPP TEAM BF	3 l/ha		2 - 3 mal.