Karotten / FiBL

BIO

Leu+Gygax AG

	Vor der Pflanzung	BBCH 0-10	BBCH 10-12	BBCH 14	BBCH 19	BBCH 39-49	WF in Tagen	Hinweise
Krankheiten								
Alternaria-Möhrenschwärze			**Flowbrix** 0.45-0.7 % 4.5-7 l/ha				21	1. Behandlung bei Befallsbeginn, regelmässige Behandlungen in Abständen von 7-10 Tagen. Vorsicht wegen Phytotoxizität!
Alternaria-Möhrenschwärze			**Cuproxat flüssig** 13-18 l/ha				21	
Alternaria-Möhrenschwärze			**Quiz** 0,225 l/100 l Wasser					
Echter Mehltau			**Carbyc** 1 %				1	
Alternaria			**Sambesi** 4-8 l/ha					
Schädlinge								
Blattläuse, Spinnmilben			**Vista** 2 %				7	
Blattläuse, Weisse Fliegen			**Piretro verde** 2.5 l/ha				3	Max. 4 Behandlungen pro Kultur und Jahr.
Blattläuse			**Ortiga** 7 l/ha					Verbessert die Pflanzenaktivität z.B. bei parasitären Angriffen, Klimastress.
Biostimulatoren								
Organischer Düngerlösung				**Fence N** 1.5-3 l/ha				
Braunalgenextrakt		**Noctudor** 4 l/ha						
Braunalgen und Hefeextrakt		**Pidel** 4 l/ha						
Braunalgenextrakt	**Harvel** 10 l/ha							
Pflanzenextrakt		**Hi-Grow** 5 l/ha						
Düngungen								
Bor				**Micro Bor** 1-3 l/ha				Bei Bormangel. (Splittbehandlung)
Stickstoffbakterien	**Azofix plus** 1-2 l/ha							Bakterien die Luftsticktoff pflanzenverfügbar machen.
Phosphorbakterien	**Fosfix plus** 1-2 l/ha							Bakterien die Phosphor pflanzenverfügbar machen.