Gemüsebau

Leu+Gygax AG

Kohlarten

	Blumenkohl, Broccoli Romanesco (Blumenkohle)	Chinakohl (Blattkohle)	Federkohl (Blattkohle)	Weiss-, Rotkabis, Wirz (Kopfkohle)	Rosenkohl	Kohlrabi		WF = Wartefrist in Tagen	
							Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.		
Ungräser, Ausfallgetreide, Quecke	●	●	●	●	●	●	**Agil** 0,75 - 2,5 l/ha	56	2-2,5 l/ha gegen Quecke.
Einjährige Unkräuter und Ungräser	●	●	●	●	●	●	**Caravel** 0,25 l/ha		Vor oder unmittelbar nach der Pflanzung.
Einjährige Unkräuter und Ungräser	●			●	●	●	**Galipan** 2,5 l/ha		Vor der Saat oder vor der Pflanzung, mit flacher Einarbeitung. Nur Broccoli.
Breitblättrige Unkräuter	●		●	●	●	●	**Lentagran** 2 kg/ha	28 / 42	3-4 Wochen nach der Pflanzung oder Saat.
Herbizid vor der Pflanzung	●	●	●	●	●	●	**Pendi** 3,5 - 4,4 l/ha		Nur möglich, wenn mit einer **Bandsetzmaschine** gepflanzt wird.
Herbizid mit breiter Wirkung in gepflanzten Kohlarten	●	●	●	●	●	●	**Trax** 1,5 - 2 l/ha		Max. 1 kg Wirkstoff / ha. **(GWS)**
Blattfleckenpilze	●	●	●	●	●	●	**Bogard** 0,5 l/ha	14	Maximal 3 Behandlungen pro Jahr. **(GWS)**
Blattfleckenpilze, Echter Mehltau, Falscher Mehltau, Ringflecken, Weisser Rost, Teilwirkung: Graufäule	●	●	●	●	●		**Diagonal** 1 l/ha	14	Maximal 3 Behandlungen pro Kultur. Nur Blumenkohl.
Alternaria-Kohlschwärze, Blattfleckenpilze, Wurzelhals- und Stengelfäule, Teilwirkung: Falscher Mehltau	●	●	●	●	●		**Flint** 0,4 kg/ha	7	Maximal 3 Behandlungen pro Kultur.
Adernschwärze	●	●	●	●	●	●	**Flowbrix** 0,2 % oder **Cuproxat flüssig** 0,4 %		Nur zur Anzucht von Jungpflanzen. Nur zur Anzucht von Jungpflanzen.
Adernschwärze	●	●	●	●	●	●	**Kupfer Bordo LG** 5 kg/ha		Nur zur Anzucht von Jungpflanzen.
Blattflecken	●	●	●	●	●	●	**Quiz** 0,225 l/100 l + **Magna Bon** 1 l/ha		2 Behandlungen zum Start der Kultur.
Falscher Mehltau	●				●		**Revus** 0,6 l/ha	14	Maximal 2 Behandlungen pro Kultur.
Erdflöhe, Erdraupen, Eulenraupen, Kohlschabe, Kohldrehherzgallmücke, Rapsminierfliege, Weisslinge.	●	●	●	●	●	●	**Audienz** 0,03-0,04 % 0,3-0,4 l/ha		
Kohlfliege	●	●	●	●	●	●	**Audienz** 0,2-0,36 % 12-20 ml/1000 Pflanzen		Anwendung im Giessverfahren bei Jungpflanzen.
Rapsglanzkäfer	●	●	●	●	●	●	**Audienz** 0,2 l/ha		Ab Befallsbeginn.
Blattläuse	●	●	●	●	●	●	**Piretro verde** 2,5 l/ha		Max. 4 Behandlungen, im Abstand von mind. 7 Tagen. **(GWS)**
Blattläuse	●	●	●	●	●	●	**Pirimor** 0,05 %		Bei Auftreten. **(GWS)**
Eulenraupen (blattfressend), Kohlschabe, Weisslinge.	●	●	●	●	●		**Rapid** 1,5 kg/ha	7	**(GWS)**
Weisse Fliegen, Blattläuse, Spinnmilben, saugende Insekten	●	●	●	●	●	●	**Siltac plus** 0,1 - 0,15 %	1	Nur bei trockenem Wetter, tagsüber. Die Spritzbrühe muss schnell antrocknen.
Blattläuse (Röhrenläuse), Erdflöhe, Erdraupen, Eulenraupen (blattfressend) Kohldrehherzgallmücke, Kohlschabe, Minierfliegen, Thripse, Weisse Fliegen (Mottenschildläuse), Weisslinge.	●	●	●	●	●	●	**Techno 10 CS** 0,1 l/ha	3	Teilweise mit Sonderbewilligung. **(GWS)**
Weisse Fliegen, Blattläuse, Spinnmilben	●	●	●	●	●	●	**Vista** 20 l/ha	7	Pflanzen allseitig gut benetzen, da Wirkung nur bei direktem Kontakt.
Eulenraupen, Kohleule, Kohlschabe, Kohlweisslinge	●	●	●	●	●	●	**XenTari** 1 kg/ha	7	
Pflanzenstärkung bei insektizidem Befall	●	●	●	●	●	●	**Noctudor** 3 l/ha	7	Im Abstand von 7-14 Tagen.
	●	●	●	●	●	●	**Pidel** 3 l/ha	14	Im Abstand von 7-14 Tagen.
	●	●	●	●	●	●	**Harvel** 3 l/ha		Bodenapplikation.
Organische Stickstoffdüngerlösung mit Pflanzenextrakte.	●	●	●	●	●	●	**Fence N** 1,5 - 3 l/ha	7	
Calciummangel (Innenblattschwärze)	●	●	●	●	●	●	**Basfoliar Combi STIPP** 3 l/ha **Tip-Calcium** 1,5 - 3 l/ha	7	Insbesondere China-. Blumen- und Rosenkohl min. 3 Behandlungen.
Bormangel	●	●	●	●	●	●	**Micro Bor** 3 l/ha		Bei Bedarf (BBCH 16-18).
Wachstumsförderung	●	●	●	●	●	●	**Fetrilon Combi** 0,1 - 1 kg/ha		Als Zusatz zu Insektizid- oder Fungizidspritzungen.
Mg-Mangel	●	●	●	●	●	●	**Olimag** 0,4 - 0,6 %		
Vitalität und klimabedingte Stressbewältigung	●	●	●	●	●	●	**Polygrün** 1 l/ha		2 - 3 Behandlungen.
	●	●	●	●	●	●	**Vital** 1 l/ha		2 - 3 Behandlungen.
	●	●	●	●	●	●	**Penergetic p Gemüse** 0,1-0,2 kg/ha		2 - 3 Behandlungen.