Leu+Gygax AG

Tomaten

WF = Wartefrist in Tagen

Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.

Einjährige Ungräser und Quecken	**Agil**	1,5-2,5 l/ha	56	7-10 Tage nach der Pflanzung. (GWS)
Herbizid Freiland	**Condoral SC**	0,5 l/ha		2-3 Blattstadium der Ungräser.
Alternaria, Echter Mehltau, Septoria	**Bogard**	0,05 %		Max. 3 Behandlungen. (GWS)
zusätzlich Kraut- und Fruchfäule	**Bogard + Ranman Top**	0,05 % 0,05 %	3	Max. 3 Behandlungen. (GWS)
Echter Mehltau	**Celos** BIO TEAM BF	0,1-0,2 %	3	Temperatur beobachten.
Echter Mehltau	**Carbyc** BIO TEAM BF	0,5-1 %	1	Anwendung: Stadium BBCH 12-89.
Alternaria spp., Kraut- und Fruchtfäule, Septoria-Blattfleckenkrankheit, Bakterielle Fleckenkrankheit Bakterielle Tomatenwelke	**Cuproxat flüssig** BIO	1,3-1,8 %	3	
	Flowbrix BIO	0,45-0,7 %	3	
	Kupfer Bordo LG BIO	1,3-1,8 %	3	
Alternaria, Echter Mehltau, Kraut- und Fruchtfäule	**Diagonal**	1 l/ha	3	Max. 3 Behandlungen pro Kultur.
Graufäule, Sclerotinia-Fäule. (Gewächshaus)	**Pyrus 400 SC**	0,125 %	3	Max. 3 Behandlungen pro Kultur.
Botrytis cinerea	**Prestop** BIO TEAM BF	0,5 %		
Fusarium spp., Phytophthora spp., Pythium spp., Rizoctonia spp.	**Prestop** BIO TEAM BF	0,5 %		Giessen. (Gewächshaus).
Graufäule, Slcerotinia-Fäule	**Switch**	0,1 %	3	Max. 2 Behandlungen pro Kultur. (GWS)
Minierfliegen	**Audienz** BIO	0,4-0,8 l/ha	3	(GWS)
Erdraupen, Eulenraupen, Thripse	**Audienz** BIO	0,03-0,04% 0,3-0,4 l/ha	3	(GWS)
Tomatenminiermotten	**Audienz** BIO	0,03% 0,3 l/ha	3	Max. 2 Behandlungen pro Kultur und Jahr. (GWS)
Spinnmilben	**Acramite**	0,25 l/ha	3	Anwendbar bis spätestens 11.07.2025. (GWS)
Spinnmilben	**Credo**	0,04 %	3	(GWS)
Blattläuse, Weisse Fliegen	**Oikos** BIO	0,15 %	3	Bei Befall 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.
Blattläuse, Weisse Fliegen	**Piretro verde** BIO	2,5 l/ha	3	Max. 4 Behandlungen pro Kultur und Jahr. Behandlungen im Abstand von mind. 7 Tagen.
Blattläuse div. Arten	**Pirimor**	0,05 %	7	Nützlingsschonend. (GWS)
Tomatenminiermotten	**Rapid**	0,15 % 1,5 kg/ha	3	Maximal 2 Behandlungen. (GWS)
Blattsaugende Insekten	**Siltac plus** TEAM BF	0,1 %		Spritzbrühe muss schnell antrocknen.
Blattläuse, Erdraupen, Minierfliegen, Thripse	**Techno 10 CS**	0,01 % 0,1 l/ha	3	Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen. Max. 2 Behandlungen mit diesem Wirkstoff. (GWS) nur mit Sonderbewilligung.(GWS)
Weisse Fliegen	**Vista** BIO TEAM BF	2 % 20 l/ha	7	Temperatur nicht über 25 °C bei Behandlung.
Eulenraupen	**XenTari** BIO TEAM BF	0,1 %		Bei Befall 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.

Einsatz von Nutzinsekten siehe Seite 43 oder fragen Sie den örtlichen LG-Berater.

Calciummangel, Blütenendfäule	**Basfoliar Combi** STIPP	0,2-0,3 % (2-3 l/ha)	TEAM BF	3-5 Spritzungen notwendig oder 0,1 % giessen 5 l/m² 2mal innert 1 Woche, anschliessend nach Bedarf.
Blattvergilbung	**Fetrilon-Combi** [1]	1 kg/ha		Pflanzenverträglicher Blattdünger.
Organischer Stimulator	**Aminopower plus** TEAM BF	1-2 l/ha		Mischbar mit Fungiziden.