Leu+Gygax AG

WF = Wartefrist in Tagen

Zwiebeln / Schalotten

Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.

	Speisezwiebeln	Gemüsezwiebeln	Bundzwiebeln	Schalotten			WF	
	●	●	●		**Pendi**	2-3 l/ha		Vor dem Auflaufen der Unkräuter. In leichten Böden untere Dosierung. Saattiefe mindestens 3 cm.
Gegen breitblättrige Unkräuter	●	●	●	●	**Lentagran**	2 kg/ha	28	Nachauflauf ab 3-Blattstadium.
Ungräser, Ausfallgetreide, Quecke	●	●	●	●	**Agil**	1 - 2,5 l/ha	56	2-2,5 l/ha gegen Quecke.
Einj. Ungräser und Unkräuter	●	●	●	●	**Laguna**	3 l/ha		Vorauflauf. Nur gesteckte Kulturen. **(GWS)**
Purpurflecken, Rostpilze, Samtfleckenkrankheit	●	●	●	●	**Bogard**	0,5 l/ha	14	Maximal 3 Behandlungen pro Jahr. **(GWS)**
Echter Mehltau	●	●	●	●	**Carbyc** 0,3-1 %	2,5-5 kg/ha BIO TEAM BF	1	Behandlungim Abstand von 10 Tagen.
Falscher Mehltau	●	●	●	●	**Diagonal**	1 l/ha	14	Maximal 3 Behandlungen pro Kultur. **(GWS)**
Botrytis	●	●	●		**Switch**	1 kg/ha	14	Maximal 2 Behandlungen pro Jahr. **(GWS)**
Mehlkrankheit	●	●	●		**Switch**	1 kg/ha		Maximal 2 Behandlungen pro Jahr. 1. Behandlung im 2-Blattstadium 2. Behandlung 3 Wochen später (bei Herbstsaat im Frühjahr). **(GWS)**
Thripse				●	**Audienz** BIO	0,2 l/ha	7	Max. 3 Behandlungen pro Kultur/Jahr.
Minierfliegen, Thripse	●	●	●		**Audienz** BIO	0,4 l/ha	7	Max. 4 Behandlungen pro Parzelle und Jahr in dieser Kultur. **(GWS)**
Blattläuse, Weisse Fliegen	●	●	●	●	**Piretro verde** BIO	2,5 l/ha	3	Max. 4 Behandlungen pro Parzelle und Jahr. Behandlungen im Abstand von mind. 7 Tagen. **(GWS)**
Blattläuse	●	●		●	**Pirimor**	0,5 kg/ha	7	Keine Anwendung bei Bundzwiebeln. **(GWS)**
Blattläuse (Röhrenläuse, Erdraupen, Lauchmotten, Thripse	●	●	●	●	**Techno 10 CS**	0,1 l/ha	14	Maximal 3 Behandlungen pro Kultur. Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen. **(GWS)** nur mit Sonderbewilligung.
Blattsaugende Insekten	●	●	●	●	**Siltac plus** TEAM BF	0,15 %		Maximal 3 Behandlungen pro Kultur. Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen.
Eulenraupen				●	**XenTari** BIO TEAM BF	1 kg/ha		Nicht bei kaltem Wetter einsetzen. Nur gegen junge Larvenstadien.**(GWS)**
Schnecken	●	●	●	●	**Amilon 5**	7 kg/ha		Auf den Boden zu streuen. Keine essbaren Pflanzenteile bestreuen.
Maulwürfe, Wühl- oder Schermäuse	●	●	●	●	**Campa** 1-5 Patronen/Kolonie	TEAM BF		Die Gänge sind gut abzudichten.
Keimhemmung	●	●		●	**Fazor**	3,5-4 kg/ha		20-30 % der Schäfte geknickt. Hinweis Seite 65.
	●	●	●	●	**Dexa Pro** BIO TEAM BF	4 l/ha		Der Spritzbrühe beifügen.
	●	●	●	●	**Fetrilon-Combi** [1]	1 kg/ha		Der Spritzbrühe beifügen.
Vitalität und klimatische Stressbewältigung	●	●	●	●	**Polygrün** BIO TEAM BF	1 l/ha		2-3 Behandlungen. Ab Stadium BBCH 14.
					+			
	●	●	●	●	**Vital** BIO TEAM BF	1 l/ha		
					+			
	●	●	●	●	**Penergetic p Gemüse** BIO	0,1 kg/ha TEAM BF		
	●	●	●	●	**Azofix plus und Foxfix plus**	1 l/ha BIO TEAM BF		Zur Erhöhung des Stickstoff und Phosphors im Boden.