

**Hinweise**

Austrieb

Blütenknospen  
sichtbar

Vollblüte

Fruchtentwicklung

Nach der Ernte

**Fungizid**

Rutenkrankheiten

**Cuproxat flüssig**  
0.5-1.3% 5-13 l/ha

**Cuproxat flüssig**  
0.5-1.3% 5-13 l/ha

Rutenkrankheiten

**Flowbrix**  
0.25-0.6 % 2.5-6 l/ha l/ha

**Flowbrix**  
0.25-0.6 % 2.5-6 l/ha

Rutenkrankheiten

**Kupfer Bordo LG**  
0.5-1.3 % 5-13 kg/ha

**Kupfer Bordo LG**  
0.5-1.3 % 5-13 kg/ha

Anwendung: Vor der Blüte und nach der Ernte. Höchstens 4 kg Kupfer-Metall je Hektar und Jahr.

Anwendung: Vor der Blüte und nach der Ernte. Höchstens 4 kg Kupfer-Metall je Hektar und Jahr.

Anwendung: Vor der Blüte und nach der Ernte. Höchstens 4 kg Kupfer-Metall je Hektar und Jahr.

**Insektizid**

Frostspanner, Napfschildläuse,  
Spinnmilben

**Spray Oil 7-E**  
3,5 % 35 l/ha

Gallmilben, Brombeermilbe

**Celos**  
2 % 20 kg/ha

**Celos**  
1 % 10 kg/ha

**Celos**  
1 % 10 kg/ha

Anwendung: Austriebsspritzung. Bei Brombeeren kann die Konzentration auf 2 % erhöht werden.

**Biostimulator**

Bodenapplikation

**Penergetic b  
Boden**  
400 g/ha  
+  
**Terrasan**  
1.5 - 5 l/ha

**Nach der Ernte  
Penergetic b  
Boden**  
400 g/ha  
+  
**Terrasan**  
1.5-5 l/ha

Stressbewältigung

**Penergetic p Obst** 250 g/ha  
+  
**Vital** 1 l/ha

**Polygrün** 1-1,5 l/ha 2-3 Behandlungen

Bio-Stimulatoren verrotten die Pflanzenrückstände schneller, wodurch die Pilzsporen vernichtet werden, (Krankheitsdruck nimmt ab). Fördert die Bodenaktivität, was mehr Nährstoffe den Pflanzen bereitstellt.

**Terrasan und Vital nicht mit kupferhaltigen Pflanzenschutzmitteln mischen.**

Verbessert die Pflanzenaktivität z.B. bei Schädlings- und Pilzdruck, sowie bei Wetterstress.

Bodenapplikation

**Liqhumus**  
30 l/ha

Macht die Nährstoffe gleichmässig pflanzenverfügbar.

**Humusaufbau**

**Perlhumus** 150-400 kg/ha

über 3 - 4 Jahre einsetzen.

**Blattdüngung**

Bormangel

**Micro Bor**  
1-3 l/ha

Ab 4-6 Blattstadium. Bei Bedarf wiederholen. Speziell bei Trockenheit. Vorbeugend oder beim Auftreten von Mangelsymptomen. Kann mehrmals eingesetzt werden. Moorböden, 2-3 x spritzen. Wassermenge 200 l/ha. Mischbar mit L+G Fungiziden.