

Vor der Pflanzung

Keimblatt

1-2 Blatt

4 Blatt

Beginn Blüte

Nach der Ernte

Hinweise**Fungizid**

Bohnenbrand, Fettfleckenkrankheit

Cuproxat flüssig

5 % 5 l/ha

Bohnenbrand, Fettfleckenkrankheit

Flowbrix

0.2 % 2 l/ha

Bohnenbrand, Fettfleckenkrankheit

Kupfer Bordo LG

5 % 5 kg/ha

Wartefrist: 3 Wochen. Vorsicht wegen Phytotoxizität! Höchstens 4 kg Kupfer-Metall je Hektar und Jahr.

1. Behandlung bei Befallsbeginn, regelmässige Behandlungen in Abständen von 7-10 Tagen. Wartefrist: 3 Wochen. Vorsicht wegen Phytotoxizität! Höchstens 4 kg Kupfer-Metall je Hektar und Jahr.

Wartefrist: 3 Wochen. Vorsicht wegen Phytotoxizität! Höchstens 4 kg Kupfer-Metall je Hektar und Jahr.

Insektizid

Eulenraupen

XenTari 1 kg/ha

Wartefrist: 3 Tage. Nicht bei kaltem Wetter einsetzen. Nur gegen junge Larvenstadien.

Biostimulatoren

Bodenapplikation

Penergetic b Boden

400 g/ha

+

Terrasan

1.5 - 5 l/ha

Nach der Ernte**Penergetic b Boden**

400 g/ha

+

Terrasan

1.5-5 l/ha

Bio-Stimulatoren verrotten die Pflanzenrückstände schneller, wodurch die Pilzsporen vernichtet werden, (Krankheitsdruck nimmt ab). Fördert die Bodenaktivität, was mehr Nährstoffe den Pflanzen bereitstellt.

Terrasan und Vital nicht mit kupferhaltigen Pflanzenschutzmitteln mischen.

Stressbewältigung

Penergetic p Gemüse 100 g/ha

+

Vital 1 l/ha**Polygrün** 1-1,5 l/ha 2-3 Behandlungen

Verbessert die Pflanzenaktivität z.B. bei Schädlings- und Pilzdruck, sowie bei Wetterstress.

Bodenapplikation

Liqhumus 30 l/ha

Macht die Nährstoffe gleichmässig pflanzenverfügbar.

Humusaufbau**Perlhumus** 150-400 kg/ha

über 3 - 4 Jahre einsetzen.

Blattdüngung

Bormangel

Micro Bor 1-3 l/ha

Ab 4-6 Blattstadium. Bei Bedarf wiederholen. Speziell bei Trockenheit. Vorbeugend oder beim Auftreten von Mangelsymptomen. Kann mehrmals eingesetzt werden. Moorböden, 2-3 x spritzen. Wassermenge 200 l/ha. Mischbar mit L+G Fungiziden.