

									
Vorauflauf, Keimung	Auflaufen	Blatt- u. Stengelwachstum	Längenwachstum	Staudenschluss	Knospenbildung	Blüte	Blüte/Beerenbildung	Vergilbung/Abreife	Nach der Ernte
	09	10-19	21-29	31-39	51	60-69	70-79	91-97	

Hinweise

Krankheiten				Flowbrix 3 l/ha						Höchstens 4 kg Kupfer-Metall je Hektar und Jahr. Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. Bei Frühkartoffeln 2 Wochen Wartefrist.
Kraut- und Knollenfäule / Alternaria				Kupfer Bordo LG 17.5 kg/ha						
Schädlinge					Novodor 3 FC 3-5 l/ha					Biologisches Kartoffelkäferlarvizid. Splittbehandlung 2 x 2-3 l/ha. 1 mal pro Woche, sobald 30 % der Pflanzen aufgelaufen sind. Mischbar mit L+G Fungiziden.
Kartoffelkäfer / Larven										
Virusübertragende Blattläuse in Pflanzkartoffeln		Spray Oil 7-E 7 l/ha in 350 l Wasser								
Biostimulatoren										Saatgutbehandlung auf der Pflanzmaschine beim Legen der Knollen. Penergetic ist mit Cu mischbar. Bio-Stimulatoren verrotten die Pflanzenrückstände schneller, wodurch die Pilzsporen vernichtet werden, (Krankheitsdruck nimmt ab). Fördert die Bodenaktivität, was mehr Nährstoffe den Pflanzen bereitstellt. Terrasan und Vital nicht mit kupferhaltigen Pflanzenschutzmitteln mischen.
Saatgutbeizung	Penergetic p Feldbau 250 g/ha									
Bodenapplikation	Penergetic b Boden 400 g/ha + Terrasan 1.5 - 5 l/ha								Nach der Ernte Penergetic b Boden 400 g/ha + Terrasan 1.5-5 l/ha	
Stressbewältigung				Penergetic p Feldbau 100 g/ha + Vital 1 l/ha		alle 7-10 Tage				Verbessert die Pflanzenaktivität z.B. bei Schädlings- und Pilzdruck, sowie bei Wetterstress. Macht die Nährstoffe gleichmässig Pflanzenverfügbar.
				Polygrün 1-1,5 l/ha		2-3 Behandlungen				
Bodenapplikationen	Liqhumus 30 l/ha									
Humusaufbau	Perlhumus 150-400 kg/ha									über 3 - 4 Jahre einsetzen.
Blattdüngung										Moorböden, 2-3 x spritzen. Wassermenge 200 l/ha. Mischbar mit LG-Fungiziden.
Bormangel			Micro Bor 1 l/ha							