

Empfehlungen Weinbau nach Ressourceneffizienzbeiträge M4 ohne Kupfereinsatz

	800 l	800 l	600 l	600 l	800 l	1000 l	1200 l	1600 l	1600 l	1600 l	1600 l	1600 l	
Krankheiten	Stadium A BBCH 00-03	Stadium C-D BBCH 09	Stadium E 13	Stadium F 16	Stadium G 53	Stadium H 55	Stadium I 65	Stadium J 73	Stadium K 75	Stadium L 77	Stadium M 81		
Falscher Mehltau		Folpet ¹³ 0,15 % 1,2 kg/ha	Legan WG 0,075 % 0,45 kg/ha	Legan WG 0,075 % 0,45 kg/ha	Booster SF ¹⁴ 0,25% 2,5 l/ha	Mildicut ⁷ 0,25% 2,5 l/ha	Cyrano 0,2 % 2,4 kg/ha	Valis F ⁸ 0,125% 2 kg/ha	Cyrano 0,2 % 3,2 kg/ha	Booster SF ¹⁴ 0,25% 2 kg/ha	Mildicut ⁷ 0,25% 4 l/ha		
Echter Mehltau	Celos ¹⁷ 2 % 16 kg/ha		Celos ¹⁷ 0,3 % 1,8 kg/ha	Celos ¹⁷ 0,3 % 1,8 kg/ha	Celos ¹⁷ 0,3 % 2,4 kg/ha	Prox 0,05% 0,5 l/ha	Flint 0,025% 0,3 kg/ha	Prox 0,05% 0,8 l/ha	Flint 0,025% 0,4 kg/ha	Carbyc 2,5-5 kg/ha + Olimag 2-4 l/ha	Prox 0,05% 0,8 l/ha	Carbyc 2,5-5 kg/ha	
Botrytis			Penergetic p Reben 0,25 kg/ha + Vital 1 l/ha	Penergetic p Reben 0,25 kg/ha + Vital 1 l/ha		Cantus 0,1 % 1,2 kg/ha		Penergetic p Reben 0,1 % 1,2 kg/ha + Vital 1 l/ha oder Fetrilon-Combi 1 1 kg/ha	Prestop 0,167 % 2 kg/ha + Silwet L-77 0.025-0.05 %	Penergetic p Reben 0,25 kg/ha + Vital 1 l/ha + Fetrilon-Combi 1 1 kg/ha			
Pflanzenstärkung bei Insektenbefall			Boundary SW 2,5-4 l/ha	Fence N 2-3 l/ha	Boundary SW 2,5-4 l/ha	Fence N 2-3 l/ha	Boundary SW 2,5-4 l/ha	Fence N 2-3 l/ha	Boundary SW 2,5-4 l/ha	Fence N 2-3 l/ha	Boundary SW 2,5-4 l/ha	Fence N 2-3 l/ha	Boundary SW 2,5-4 l/ha
Pflanzenstärkung Dünger			Kickstart 0,15 l/ha (2 - 3 Anwendungen)				Polygrün Blüte 2 l/ha	Vital 1 l/ha + Polygrün 0,5 l/ha				mehrmals nach der Blüte	

Generelle Hinweise:

Weitere Fungizide und Herbizide aus unserem Sortiment:	Roundup Profi, Glifonex TF, Roundup Turbo
Insektizide:	Xen Tari 1,2 kg/ha Siltac plus 0,15 % 2. Generation des Traubenwicklers Schildläuse, Milben, Thripse
Akarizide:	Credo 0,32 l/ha Spinnmilben
Milben:	Spray Oil 7E: 6-16 l/ha
nach Hagel:	Folpet 0,15% 2,4 kg/ha

M1: Teilverzicht auf Herbizide.
Verzicht auf den Einsatz von Herbiziden zwischen den Reihen; unter dem Stock wird nur Blattherbizid auf einer Breite von maximal 50 cm eingesetzt.

M2: Verzicht auf Herbizide.
Vollständiger Verzicht auf Herbizide.

M3: Verzicht auf Fungizide mit besonderem Risikopotenzial, Reduktion von Kupfer.
Verzicht auf den Einsatz von Fungiziden gemäss der Liste "Pflanzenschutzmittel mit besonderem Risikopotenzial" mit Ausnahme des Einsatzes von höchstens 1,5 kg Kupfer pro Hektare und Jahr.

M4: Verzicht auf Fungizide mit besonderem Risikopotenzial.
Verzicht auf den Einsatz von Fungiziden gemäss der Liste "Pflanzenschutzmittel mit besonderem Risikopotenzial" kein Einsatz von Kupfer.

Beachten Sie den ÖLN und VITISWISS der für Ihr Gebiet zuständigen Kommission.
Die hochgestellten Zahlen beziehen sich auf die Produktnummerierung der Pflanzenschutzempfehlungen für den Weinbau 2021.
Die angegebenen Aufwandmengen und die Behandlungszeitpunkte sind dem Krankheitsdruck und den klimatischen Bedingungen anzupassen.
Einzelne Bilder sind mit der Genehmigung von der Forschungsanstalt Agroscope Changins-Wädenswil ACW gedruckt. Jedes weitere Kopieren ist untersagt.

Getreide
Mais
Herbizid-Wirkungstabelle
Kartoffeln
Rüben
Raps
Soja / Erbsen / Sonnenblumen
Feldbau div.
Fütterkonservierung
Weinbau
Kernobst/Steinobst
Gemüse / Beeren
Zierpflanzenbau
Nützlinge