

Beerenobst



	Brombeeren	Himbeeren	Johannisbeeren	Stachelbeeren	Heidelbeeren	Produkt	Anwendung	Hinweise
						WF = Wartezeit in Tagen		
	●	●	●	●	●	Silwet L-77	0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.	Bei Fungiziden und Insektiziden Basiswassermenge 1000 l/ha.
Herbizid	●	●	●	●	●	Reglone	40 ml/a	Abbrennen der Unkräuter.
						Granat	2,5-6,25 l/ha	November-Januar (während der Winterruhe).
Austern- und Napfschildläuse Frostspanner, Spinnmilben			●	●	●	Spray Oil 7-E	3,5%	Anwendung: Stadium BBCH 00-10 (B-C)
Gallmilbe	●	●				Celos	2% 1%	Kurz vor dem Austrieb. Als 2. Behandlung bei starkem Befall nach Austrieb, bei 15-20 cm Trieblänge.
Blütenstecher, Himbeerkäfer		●				Pyrinex	0,3 %	Bis Blüte.
Blütenstecher Himbeerkäfer		●				Techno 10 CS	0,02 %	21
		●				Techno 10 CS	0,01 %	21
Kirschessigfliege (Drosophila suzukii)	●	●	●	●	●	Drososan und Fruit Fly Attractant		Befallskontrolle mit Fallen.
Spinnmilben (Eier + Larven)	●	●	●	●	●	Credo	0,04 %	Vor der Blüte und nach der Ernte. Matacar, Nissostar und Credo, auf der gleichen Parzelle nur 1 mal pro Saison einsetzen.
	●	●	●	●	●	<i>Einsatz von Nutzinsekten siehe Einsatzplan Seite 95 oder fragen Sie den örtlichen LG-Berater.</i>		
Wurzelsterben		●				Ridomil Gold	0,25-0,5%	Anwendung: Vor der Blüte nach der Ernte. Giessen. Maximal 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.
Rutenkrankheiten	●	●				Cuproxtat flüssig	0,5-1-3%	Anwendung: Vor der Blüte und nach der Ernte.
	●	●				Flowbrix	0,25-0,6%	
Blattfallkrankheit			●	●	●	Cuproxtat flüssig	0,25-0,75%	21 Anwendung: Unmittelbar nach der Blüte und nach der Ernte.
			●	●	●	Flowbrix	0,15-0,4%	
Falscher Mehltau Mycosphaerella	●					Ridomil Gold	0,25-0,5 %	21 Maximal 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.
Roste		●				Bogard	0,5 l/ha	Anwendung: Max. 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr. Vor der Blüte und nach der Ernte.
Echter Mehltau			●	●		Bogard	0,5 l/ha	Anwendung: Max. 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr. Vor der Blüte und nach der Ernte.
				●		Nimrod	0,1%	14 Anwendung: Max. 5 Behandlungen im Abstand von 2 Wochen.
Mondscheinigkeit			●			Switch	1 kg/ha	7 Anwendung: Maximal 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.
Botrytis	●	●		●	●	Papyrus	0,3% %	14 Maximal 1 Behandlung pro Jahr.
	●	●		●	●	Switch	1 kg/ha	14/7 Maximal 2 Behandlungen pro Jahr.
Rutenkrankheiten Roste	●	●				Flint	0,2-0,5 kg/ha	Anwendung: Maximal 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.
Zweig- und Beerenkrankheit Echter Mehltau Graufäule (Botrytis cinerea) Mondscheinigkeit			●	●	●			
Eisenmangel	●	●	●	●	●	Ferplus Top	0,3-0,7 kg/ha	Ausgangs Winter streuen und einarbeiten.
Wachstumsförderung	●	●	●	●	●	Folifert Super	0,4-0,5%	2 Behandlungen vor der Blüte.

Getreide
Mais
Herbizid-Wirkungstabelle
Kartoffeln
Rüben
Raps
Soja / Erbsen / Sonnenblumen
Feldbau div.
Futterkonservierung
Weinbau
Kernobst/Steinobst
Gemüse / Beeren
Zierpflanzenbau
Nützlinge