

Produkt	Anwendung	Hinweise
---------	-----------	----------

Brachen und Stoppelfelder

Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.

Herbizide:

Brache, Feldsaaten, Mulchsaaten

Glifonex TF

2-3 l/ha
4-6 l/ha
4-10 l/ha

Einjährige Unkräuter und Ungräser.
Mehrjährige Gräser.
Mehrjährige Unkräuter, bei Winden 10 l/ha verwenden.

Brache, Feldsaaten, Mulchsaaten

Roundup Turbo/Profi

1,5-2,5 l/ha,-
3-5 l/ha
3-7,5 l/ha

Einjährige Unkräuter und Ungräser.
Mehrjährige Gräser.
Mehrjährige Unkräuter, bei Winden 7,5 l/ha verwenden.

bei Winden, Blacken, Disteln

+ Dialen

0,5 l/ha

In Tankmischung mit 5 l/ha Glifonex oder 4 l/ha Roundup Profi/Turbo. Letzte Anwendung Ende September.

Lein (Flachs)

Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.

Herbizide:

Unkräuter und Gräser

Speleo

25 g/ha

Nachauflauf ab 5 cm der Kultur.

Unkräuter

Effican

2 l/ha

Nachauflauf: im 2-4 Blattstadium der Unkräuter ab 5 cm der Kultur.

Effican darf nicht in der Grundwasserschutzzone S2 werden.

Starterdünger

Level 2

0,8 l/ha

5 cm Kulturhöhe. Mischbar mit Herbiziden.

Erdraupen

Techno 10 CS

0,075 l/ha

NEU

Wiesen und Weiden

Herbizide:

a) Neusaaten

MCPB LG + Effican

2 l/ha
2 l/ha

In Neusaaten vor dem 1. Schnitt. Der Klee muss 2 echte Blätter aufweisen. Wartefrist: 3 Wochen, Galttiere 2 Wochen.

Mit jungen Blackensämlingen

MCPB LG + Asulam LG

4 l/ha
1 l/ha

Ab 2-Blatt-Stadium des Klees.
Keine Anwendung in Alexandriner oder Perserklee
Wartefrist: 3 Wochen, Galttiere 2 Wochen.

Kleegrasmischungen

Lentagran

1-2 kg/ha

Im Herbst bis Mitte Oktober. Wartefrist: 3 Wochen, Galttiere 2 Wochen.

Luzerne

Effican

2 x 1 l/ha

Splitbehandlung. Effican darf nicht in der Grundwasserschutzzone S2 eingesetzt werden.

Starterdünger

Level 2

0,8 l/ha

Behandlung wenn Klee 4 echte Blätter hat.
Mischbar mit Herbiziden.

b) Flächenbehandlung:

Blacken

Asulam LG

4 l/ha

Anwendung Frühling und Herbst.
Vor Bildung der Blütenstände.

+ Flüssigdünger

4 l/ha

Wartefrist: 3 Wochen, Galttiere 2 Wochen.

Alpenblacken, Farne

Asulam LG

4 l/ha

Flüssigdünger fördert die Wirkung.
Wartefrist: 3 Wochen, Galttiere 2 Wochen.

+ Flüssigdünger

4 l/ha

Blackensämlinge und andere
breitblättrige Unkräuter

MCPB LG

4-6 l/ha

In Klee gras-Neusaaten und Einsaaten vor
1. Schnitt. Der Klee muss 2 echte Blätter entwickelt
haben. Behandlung bei wüchsigem Wetter vor
Erscheinen der Blütenstiele durchführen.
Wartefrist: 3 Wochen, Galttiere 2 Wochen.

Disteln

Duplosan KV Combi

2,5-3,25 l/ha

c) Einzelstockbehandlung

Blacken, Bärenklau, Kerbel,
Brennessel, St. Jakobskreuzkraut u.a.

Blackex

Mischverhältnis 1:2

Enthält roten Farbstoff zum besseren Erkennen
behandelter Pflanzen. Anwendung mit Sprüh- und
Spritzgeräten.

Giftige Kreuzkräuter, Weisses Germer

Zwei 4-D + Duplosan KV Combi

0,4-0,5 %
1-10 %

Wartefrist: 3 Wochen, Galttiere 2 Wochen.
Einzelstockbehandlung.

Blacken

Asulam LG

1%

Wartefrist: 3 Wochen, Galttiere 2 Wochen.

Biodiversitätsförderflächen (BFF) gemäss DZV

Herbizide:

Glifonex TF

5-10%

Roundup Turbo/Profi

5-7,5%

Ausbringung mit Handspritzgeräten ohne Rückenspritze.