

Buschbohnen

WF = Wartezeit in Tagen

Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.



Einjährige Ungräser	Agil	1 l/ha	28	<p>Vorauflauf mischbar mit Frontex. Nachauflauf mischbar mit Effican SG. Splittbehandlung mit 2 x 0,5 l/ha möglich.</p> <p>Im Keimblatt oder Unkräuter. Splittbehandlung: nicht bei Hitze und nur auf abgetrocknete Bestände spritzen. (GWS)</p> <p>Vorauflauf</p> <p>Anwendung Vorauflauf bis 3 Tage nach der Saat. Nicht in Sandböden. (GWS)</p>
Vorauflauf und Nachauflauf Unkräuter und Ungräser (speziell Amarant und Nachtschatten)	Bolero	1 l/ha		
Einjährige Unkräuter	Effican SG <small>NEU</small>	2 x 0,4 kg/ha		
Einjährige Gräser und Unkräuter	Frontier X2	1,2-1,4 l/ha		
Unkräuter und Ungräser	Frontex	1-1,6 l/ha		
Bohnenrost, Brennflecken	Bonita WG	2-3 kg/ha	21	<p>Nach der Ausbildung der ersten zwei echten Blätter. Unter Glas und Plastik, Wartezeit 7 Tage.</p> <p>Bei Befallsbeginn oder bei Sichtbarwerden der ersten Symptome Stadium 13-79 (BBCH).</p>
Bohnenrost, Brennflecken	Flint	0,04 % 400 g/ha	3	
Bohnenbrand, Fettfleckenkrankheit	Flowbrix <small>BIO</small>	2 l/ha	21	<p>1. Behandlung bei Befallsbeginn, regelmässige Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. Hochwertiges Kupferpräparat.</p>
	Cuproxtat flüssig <small>BIO</small>	4 l/ha	21	
Botrytis, Sclerotinia	Papyrus	2 l/ha	14	<p>2 Behandlungen in die aufgehende Blüte.</p> <p>Maximal 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.</p>
	Switch	0,5-0,8 kg/ha	14	
Blattläuse	Pirimor	0,5 kg/ha	7	<p>7 Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen. Maximal 2 Behandlungen mit diesem Wirkstoff. (GWS)</p>
Blattläuse, Erdraupen, Minierfliegen, Möhrenblattfloh, Möhrenfliegen, Thripse	Techno 10 CS	0,1 l/ha	7	
Eulenraupen	XenTari <small>BIO</small>	1 kg/ha		<p>im Gewächshaus. im Freiland.</p>
Blattläuse, Thripse	Siltac plus <small>TEAM BF</small>	0,1 l/ha		Auf gute Benetzung achten.
Wachstumsförderung	HBR <small>TEAM BF</small>	1 l/ha		Bei frühen Kulturen gegen Kältestress.

Fenchel



Einjährige Gräser und Unkräuter	Laguna	2 l/ha		<p>gesät Vor Pflanzung / Vorauflauf (GWS) gepflanzt</p>
Unkräuter, Ungräser	Pendi	1,5-2l/ha		<p>Unmittelbar nach der Saat oder vor der Pflanzung. Leichte Böden untere Dosierung.</p>
Einjährige Ungräser	Agil	1 l/ha	28	
Cercospora und Ramularia, Blattfleckenkrankheit	Bogard	0,5 l/ha	14	<p>Ab Befallsbeginn. Max. 3 Behandlungen pro Parzelle/Jahr. (GWS)</p> <p>Max. 3 Behandlungen pro Kultur. Behaltungen im Abstand von 10-14 Tagen.</p>
Falscher Mehltau	Ridomil Gold	2,5 kg/ha	14	
Blattläuse, Erdraupen, Minierfliegen, Möhrenblattfloh, Möhrenfliegen, Thripse	Techno 10 CS	0,1 l/ha	14	(GWS)
Blattläuse, Thripse	Siltac plus <small>TEAM BF</small>	0,1 l/ha		Auf gute Benetzung achten.
Wachstumsförderung	HBR <small>TEAM BF</small>	1 l/ha		Bei frühen Kulturen gegen Kältestress.
Bormangel	Micro Bor <small>BIO</small>	3 l/ha		Bei Bedarf wiederholen.
Calcium- und Spurenelementmangel	Basfoliar Combi <small>STIPP</small>	3 l/ha		2 - 3 mal.