

WF = Wartezeit in Tagen

1. Buschbohnen

Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.

Unkräuter und Ungräser	Frontier X2	0,8 l/ha		Anwendung Voraufbau bis 3 Tage nach der Saat. Nicht in Sandböden.
Voraufbau und Nachaufbau Unkräuter und Ungräser (speziell Amaranth und Nachtschatten)	Bolero	1 l/ha		Voraufbau mischbar mit Frontier X2. Nachaufbau mischbar mit Effican. Splitbehandlung mit 2 x 0,5 l/ha möglich.
Einjährige Unkräuter	Effican	2 x 1- 1,5 l/ha		Im Keimblatt der Unkräuter. Splitbehandlung: nicht bei Hitze und nur auf abgetrocknete Be- stände spritzen. Effican darf nicht in der Grundwasserschutzzone S2 eingesetzt werden.
Einjährige Ungräser	Agil	1 l/ha	28	
Ungräser, Einjähriges Rispengras	Aramo	2 l/ha		Vor Bildung Blütenknospen.
Blattläuse	Pirimor	0,5 kg/ha	7	
	Techno	0,2 l/ha	14	
Eulenraupen	XenTari	1 kg/ha	3 7	im Gewächshaus. im Freiland.
Blattfressende Raupen, Blattläuse, Thripse	Lannate 25 WP	1 kg/ha	14	Vor der Blüte.
Bohnenrost, Brennflecken	Bonita WG	2-3 kg/ha	21 21	Nach Ausbildung der ersten zwei echten Blätter. Unter Glas und Plastik. Wartezeit 7 Tage.
Bohnenbrand, Fettflecken- krankheit	Flowbrix oder Cuproxtat flüssig	2 l/ha 4 l/ha	21 21	1. Behandlung bei Befallsbeginn, regel- mäßige Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. Hochwertiges Kupferpräparat.
Botrytis, Sclerotinia	Papyrus	2 l/ha	14	2 Behandlungen in die aufgehende Blüte.
	Switch	0,5-0,8 kg/ha	14	Maximal 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.
Wachstumsförderung	Folifert Super	4-6 kg/ha		Höhere Erträge.



2. Fenchel

Unkräuter und Ungräser	Stomp Aqua	1,5-2 l/ha		Unmittelbar nach der Saat oder vor der Pflanzung. Leichte Böden untere Dosierung.
Einjährige Ungräser	Agil	1 l/ha	28	
Blattläuse, Erdraupen, Minierfliegen, Möhrenblatt- floh, Möhrenfliege, Thripse	Techno	0,2 l/ha	14	
Bormangel	Micro Bor	3 l/ha		Bei Bedarf wiederholen.
Calcium- und Spurenelementmangel	Basfoliar Combi STIPP	3 l/ha		2-3 mal.

