
































	Produkt	Anwendung	Hinweise
Erdbeeren	Silwet L-77 	0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.	
Vor der Pflanzung	Roundup Turbo/Profi 	3-5 l/ha	Bei Fungiziden und Insektiziden Basiswassermenge 1000 l/ha.
Splitbehandlung Einjährige Unkräuter und Ungräser			
1. Split	Betam  + Goltix 	2 l/ha 1 kg/l / ha	Ohne Sorten Alba und Mars
2. Split	Betam  + Spark 	2 l/ha 0,75 kg/ha	
3. Split	Betam  + Goltix 	2 l/ha 1 kg/l / ha	
Ungräser, Ausfallgetreide,	Agil 	0,75-1,5 l/ha	
Quecke	Agil 	1,75-2,5 l/ha	
Rhizomfäule, Rote Wurzelfäule	Ridomil Gold 	0,5 % oder 0,1 l je Pflanze	Einmaliges Angiessen sofort nach der Pflanzung auf feuchten Boden. Gegen Rote Wurzelfäule 2. Einsatzzeitpunkt nach Mitte Oktober. Nur 1 Behandlung pro Jahr.
Botrytis	Papyrus  Switch 	3 l/ha 1 kg/ha	Maximal 1 Behandlung pro Jahr. Wartefrist: 2 Wochen. Maximal 2 Behandlungen pro Jahr.
Blattfleckenkrankheit Brennflecken, Gnomonia- Fruchtfäule (Teilw.)	Cuproxat flüssig  Thiram 	3-7,5 l/ha 3 kg/ha	Vor der Blüte und nach der Ernte. Vor der Blüte und nach der Ernte.
Echter Mehltau	Celos  Stroby  Bogard  Nimrod 	2 kg/ha 4 kg/ha 0,3 kg/ha 0,5 l/ha 1 l/ha	Vor der Blüte. Nach der Ernte. Wartefrist: 2 Wochen. Max. 3 Anwendungen Wartefrist: 3 Wochen. Maximal 4 Behandlungen pro Jahr. Wartefrist: 1 Woche
Blattläuse	Pirimor 	0,4 kg/ha	Wartefrist: 3 Wochen.
Erdbeerblütenstecher	Techno 	0,4 l/ha	
Erdbeerblütenstecher, Thrips	Pyrinex 	3 l/ha	Wartefrist: 3 Wochen.
Spinnmilben (Eier + Larven)	Matacar  oder Credo  NEU	1 kg/ha 0,4 l/ha	Vor der Blüte. Matacar, Credo, Trevi oder Apollo auf der gleichen Parzelle nur 1mal pro Saison einsetzen.
Spinnmilben (Eier, Larven, Adulte)	Acramite 	0,25 l/ha	Wartefrist: 3 Tage.
Eulenraupen	XenTari 	1 kg/ha	Wartefrist: 3 Tage im Gewächshaus. Wartefrist: 7 Tage im Freiland.
Schnecken	Antischneck-Feinkorn  oder Epanex 	5-10 kg/ha	
Bor-Mangel	Micro-Bor 	1 l/ha	Ab grüne bis weisse Knospen.
Beerenqualität und Haltbarkeit	Folifert Super  Basfoliar Combi  STIPP	4 kg/ha 3 l/ha	Bis Blüte. Ab Blüte. Basfoliar erhöht die Fruchtfestigkeit. Jeder Fungizid-Spritzung beigegeben. Mind. 3 Behandlungen.
Eisenmangel	Ferplus Top 	0,3-0,7 kg/a	Ausgangs Winter streuen und einarbeiten.
Bor-, Fe-, Mg-, Mn-Mangel	Fetrilon-Combi 	1,5 kg/ha	2 Behandlungen vor der Blüte.

