

WF = Wartezeit in Tagen

## 1. Buschbohnen

**Silwet L-77** 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.

Unkräuter und Ungräser	<b>Frontier X2</b>	0,8 l/ha		Anwendung Voraufbau bis 3 Tage nach der Saat. Nicht in Sandböden.
Voraufbau und Nachaufbau Unkräuter und Ungräser (speziell Amaranth und Nachtschatten)	<b>Bolero</b>	1 l/ha		Voraufbau mischbar mit Frontier X2. Nachaufbau mischbar mit Effican. Splitbehandlung mit 2 x 0,5 l/ha möglich.
Einjährige Unkräuter	<b>Effican</b>	2 x 1- 1,5 l/ha		Im Keimblatt der Unkräuter. Splitbehandlung: nicht bei Hitze und nur auf abgetrocknete Be- stände spritzen. Effican darf nicht in der Grundwasserschutzzone S2 eingesetzt werden.
Einjährige Ungräser	<b>Agil</b>	1 l/ha	28	
Ungräser, <b>Einjähriges Rispengras</b>	<b>Aramo</b>	2 l/ha		Vor Bildung Blütenknospen.
Blattläuse	<b>Pirimor</b>	0,5 kg/ha	7	
	<b>Techno</b>	0,2 l/ha	14	
Eulenraupen	<b>XenTari</b>	1 kg/ha	3 7	im Gewächshaus. im Freiland.
Blattfressende Raupen, Blattläuse, Thripse	<b>Lannate 25 WP</b>	1 kg/ha	14	Vor der Blüte.
Bohnenrost, Brennflecken	<b>Bonita WG</b>	2-3 kg/ha	21 21	Nach Ausbildung der ersten zwei echten Blätter. Unter Glas und Plastik. Wartezeit 7 Tage.
Bohnenbrand, Fettflecken- krankheit	<b>Flowbrix</b> oder <b>Cuproxtat flüssig</b>	2 l/ha 4 l/ha	21 21	1. Behandlung bei Befallsbeginn, regel- mäßige Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. Hochwertiges Kupferpräparat.
Botrytis, Sclerotinia	<b>Papyrus</b>	2 l/ha	14	2 Behandlungen in die aufgehende Blüte.
	<b>Switch</b>	0,5-0,8 kg/ha	14	Maximal 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.
Wachstumsförderung	<b>Folifert Super</b>	4-6 kg/ha		Höhere Erträge.



## 2. Fenchel

Unkräuter und Ungräser	<b>Stomp Aqua</b>	1,5-2 l/ha		Unmittelbar nach der Saat oder vor der Pflanzung. Leichte Böden untere Dosierung.
Einjährige Ungräser	<b>Agil</b>	1 l/ha	28	
Blattläuse, Erdraupen, Minierfliegen, Möhrenblatt- floh, Möhrenfliege, Thripse	<b>Techno</b>	0,2 l/ha	14	
Bormangel	<b>Micro Bor</b>	3 l/ha		Bei Bedarf wiederholen.
Calcium- und Spurenelementmangel	<b>Basfoliar Combi STIPP</b>	3 l/ha		2-3 mal.

