

## 3. Gurkengewächse



	Cornichon	Gurke	Kürbis	Melone	Patisson	Zucchini		WF = Wartezeit in Tagen
--	-----------	-------	--------	--------	----------	----------	--	-------------------------

	•	•	•	•	•	•	<b>Silwet L-77</b>	0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.	
Eisenmangel (z.B. hellgrüne Gurke, im Treibhaus)	•	•	•	•	•	•	<b>Ferplus Top</b>	0,3-0,7 kg/ha	Vor der Pflanzung einfräsen oder nach der Pflanzung einarbeiten.
Gummistengelkrankheit / Didymella (Treibhaus)	•						<b>Bogard</b>	0,05 %	3 Maximal 4 Behandlungen pro Jahr.
Alternaria, Echter Mehltau, Krätze				•	•		<b>Bogard</b>	0,5 l/ha	21 Ab Befallsbeginn, maximal 4 Behandlungen pro Jahr.
Alternaria, Echter Mehltau, Falscher Mehltau, Krätze				•	•		<b>Ranman Top</b> <b>+ Bogard</b>	0,5 l/ha 0,5 l/ha	21 Anwendung nur im Gewächshaus. Ranman nicht mit Silwet L-77 mischen.
Echter Mehltau, Falscher Mehltau (Treibhaus)	•						<b>Stroby</b> <b>+ Forum</b>	0,03 % 0,1 %	3 Gut verträgliche und wirkungsvolle Mischung. Vorbeugend alle 8-12 Tage gründlich spritzen. Warnmeldung beachten. Max. 3 Behandlungen.
Alternaria, Botrytis		•					<b>Proton</b>	0,1 %	3
Echter Mehltau	•	•	•	•	•	•	<b>Stroby</b>	0,03 %	3 Max. 3 Behandlungen.
	•	•	•	•	•	•	<b>Celos</b>	0,1 - 0,2 %	3 Temperatur beachten.
Eckige Blattfleckenkrankheit, Falscher Mehltau (Treibhaus)	•						<b>Flowbrix</b> <b>oder</b> <b>Cuproxtat flüssig</b>	2 l/ha 4 l/ha	21 1. Behandlung bei Befallsbeginn, regelmäßige Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. 21 Hochwertiges Kupferpräparat.
Botrytis, Sclerotinia		•					<b>Papyrus</b>	0,125 %	3 Maximal 1 Behandlung pro Jahr.
		•					<b>Switch</b>	0,1 %	3 Maximal 2 Behandlung pro Produktionszyklus.
Falscher Mehltau	•	•	•	•	•	•	<b>Ranman Top</b>	0,5 l/ha	3 Anwendung nur im Gewächshaus. Behandlungen im Abstand von 8-10 Tagen, maximal 3 Anwendungen.
Echter Mehltau, Falscher Mehltau	•	•	•	•	•	•	<b>Stroby</b> <b>+ Ranman Top</b>	0,03 % 0,5 l/ha	3 <b>Ranman nicht mit Silwet L-77 mischen.</b>
Blattläuse, Blattfressende Raupen		•		•			<b>Lannate</b> <b>Lannate</b>	0,1 % 1 kg/ha	3 14 Treibhausgurken  Anwendung ab Pflanzung bis 1. Frucht ausgebildet ist! Freilandmelonen
Blattläuse	•	•	•	•	•	•	<b>Pirimor</b>	0,05 %	7 Nützlingsschonend.
Thripse	•	•	•	•	•	•	<b>Techno</b>	0,2 l/ha	3 Keine Anwendung bei Nützlingseinsatz.
Eulenraupen			•				<b>Pyrinex</b>	3 l/ha	14 Anwendung nur in Ölkürbissen.
Eulenraupen		•		•			<b>XenTari</b>	0,1 % 1 kg/ha	3 7 im Gewächshaus. im Freiland.
Spinnmilben (Eier, Larven, Adulte)	•	•	•	•	•	•	<b>Acramite</b>	0,25 l/ha	3
Nutzinsekten (Treibhaus)	•	•	•	•	•	•	Siehe Einsatzplan Seite 94 oder fragen Sie den örtlichen LG-Berater.		