












# Gemüsebau

## Gurken- und Kürbisgewächse

	Gurken, Essiggurken, Cornichon	Wassermelonen	Melonen	Ökürbisse	Kürbisse mit geniessbarer Schale	Kürbisse mit ungeniessbarer Schale	WF = Wartefrist in Tagen		
	●	●	●	●	●	●	Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.		
Einjährige Ungräser und Unkräuter (Freiland)				●			Frontex	1,25 l/ha	Vorauslauf. (GWS)
Einjährige Ungräser und Unkräuter (Freiland)	●				●		Goltix 700 SC	5 l/ha	Zwischenreihenbehandlung. Maximal 1 Behandlung pro Kultur.
Echter Mehltau	●	●	●	●	●	●	Carbyc 	1 % 3-5 kg/ha	Anwendung: Stadium BBCH 12 bis 89.
Gummistengelkrankheit [Didymella bryoniae]	●						Bogard	0,5 l/ha	3 Maximal 3 Behandlungen. (GWS)
Alternaria, Echter Mehltau, Krätze.					●		Bogard	0,5 l/ha	3 Maximal 3 Behandlungen. (GWS)
Alternaria, Echter / Falscher Mehltau, Krätze.	●				●		Bogard	0,5 l/ha	3 Maximal 3 Behandlungen. (GWS)
Echter Mehltau	●				●		Flint	0,5 % 0,5 kg/ha	3 Ab Befallsbeginn.
Gummistengelkrankheit		●	●	●	●		Flint	0,25 kg/ha	Maximal 3 Behandlungen.
Echter Mehltau	●	●	●	●	●	●	Celos 	0,1-0,2 % 1-2 kg/ha	3 Temperatur beachten.
Teilwirkung: Eckige Blattfleckenkrankheit, Falscher Mehltau	●						Flowbrix 	2 l/ha	21 1. Behandlung bei Befallsbeginn, regelmäßige Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. Hochwertiges Kupferpräparat.
Botrytis, Sclerotinia	●						Cuproxat flüssig 	4 l/ha	21
Botrytis, Sclerotinia (Gewächshaus)	●						Switch	0,1 %	3 Maximal 2 Behandlungen pro Kultur. (GWS)
Falscher Mehltau (Gewächshaus)	●	●	●	●	●	●	Papyrus	0,125 % 1,25 l/ha	3 Maximal 1 Behandlung pro Kultur. (GWS)
Falscher Mehltau	●				●		Ranman Top	0,05 % 0,5 l/ha	3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.
Falscher Mehltau	●				●		Booster	3,5 l/ha	15 Maximal 3 Behandlungen pro Kultur.
Blattläuse, Thripse	●	●	●	●	●	●	Siltac plus 	0,1 %	2-3 Behandlungen im Abstand von etwa 7-10 Tagen.
Blattläuse	●	●	●	●	●	●	Pirimor	0,05 %	7 Nützlingsschonend. (ohne Gurkenblattlaus). (GWS)
Thripse, Blattläuse, Erdraupen, Minierfliegen	●	●	●	●	●	●	Techno 10 CS	0,1 l/ha	3 Keine Anwendung bei Nützlingseinsatz. (GWS)
Eulenraupen	●		●				XenTari 	0,1 % 1 kg/ha	3 im Gewächshaus. 7 im Freiland.
Eulenraupen	●	●	●	●	●	●	Rapid	0,15 % 1,5 kg/ha	3 Maximal 2 Behandlungen pro Jahr. (GWS)
Spinnmilben (Eier, Larven, Adulte)	●	●	●	●	●	●	Acramite	0,25 l/ha	3 (GWS)
Weisse Fliegen	●						Vista 	2 %	7 Pflanzen allseitig gut benetzen.
Blattläuse, Spinnmilben	●	●	●	●	●	●	Vista 	20 l/ha	7 Pflanzen allseitig gut benetzen.
Nutzinsekten (Treibhaus)	●	●	●	●	●	●	Siehe Seite 46 oder fragen Sie den örtlichen LG-Berater.		
Magnesiumdünger	●	●	●	●	●	●	Olimag 	0,4-0,8 %	Anwendung: Stadium BBCH 12 bis 89.
Stickstoffdünger Lösung	●	●	●	●	●	●	Boundary SW 	2,5-3,5 l/ha	Anwendung: Stadium BBCH 12 bis 89.
Eisenmangel (z.B. hellgrüne Gurke im Treibhaus)	●	●	●	●	●	●	Ferplus Top	0,3-0,7 kg/are	Vor der Pflanzung einfräsen oder nach der Pflanzung einarbeiten.

Getreide  
Mais  
Herbizid-Wirkungstabelle  
Kartoffeln  
Rüben  
Raps  
Soja / Erbsen / Sonnenblumen  
Feldbau div.  
Futterkonservierung  
Weinbau  
Kernobst / Steinobst  
Gemüse / Beeren  
Zierpflanzenbau  
Nützlinge