

3. Gurken- und Kürbisgewächse



	Cornichon	Gurke	Kürbis	Melone	Patisson	Zucchetti		WF = Wartezeit in Tagen
	●	●	●	●	●	●	Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.	
Eisenmangel (z.B. hellgrüne Gurke, im Treibhaus)	●	●	●	●	●	●	Ferplus Top 0,3-0,7 kg/ha	Vor der Pflanzung einfräsen oder nach der Pflanzung einarbeiten.
Gummistengelkrankheit / Didymella (Treibhaus)	●						Bogard 0,05%	3 Maximal 4 Behandlungen pro Jahr.
Alternaria, Echter Mehltau, Krätze					●	●	Bogard 0,5 l/ha	21 Ab Befallsbeginn, maximal 4 Behandlungen pro Jahr.
Alternaria, Echter Mehltau, Falscher Mehltau, Krätze					●	●	Ranman Top + Bogard 0,5 l/ha 0,5 l/ha	21 Anwendung nur im Gewächshaus. Ranman nicht mit Silwet L-77 mischen.
Echter Mehltau / Gummistengelkrankheit	●	●	●	●			Flint Flint 0,5% 0,5 kg/h 0,25 kg/ha	3 Ab Befallsbeginn. Max. 3 Behandlungen.
	●	●	●	●	●	●	Celos 0,1 - 0,2 %	3 Temperatur beachten.
Eckige Blattfleckenkrankheit, Falscher Mehltau (Treibhaus)	●						Flowbrix 2 l/ha oder Cuproxtat flüssig 4 l/ha	21 1. Behandlung bei Befallsbeginn, regelmäßige Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. Hochwertiges Kupferpräparat.
Botrytis, Sclerotinia	●						Papyrus 0,125 %	3 Maximal 1 Behandlung pro Jahr.
	●						Switch 0,1 %	3 Maximal 2 Behandlung pro Produktionszyklus.
Falscher Mehltau	●	●	●	●	●	●	Ranman Top 0,5 l/ha	3 Anwendung nur im Gewächshaus Behandlungen im Abstand von 8-10 Tagen, maximal 3 Anwendungen.
Falscher Mehltau	●	●					Booster 3,5 l/ha	3 Ab Befallsbeginn. Max. Behandlungen.
Blattläuse	●	●	●	●	●	●	Pirimor 0,05 %	7 Nützlingsschonend.
Thripse, Blattläuse, Erdraupen, Minierfliegen	●	●	●	●	●	●	Techno 10 CS 0,2 l/ha	3 Keine Anwendung bei Nützlingseinsatz.
Eulenraupen			●				Pyrinex 3 l/ha	14 Anwendung nur in Ölkürbissen.
Eulenraupen		●	●				XenTari 0,1 % 1 kg/ha	3 im Gewächshaus. 7 im Freiland.
Eulenraupen	●	●	●	●	●	●	Rapid 0,15 % 1,5 kg/ha	3 Maximal 2 Behandlungen pro Jahr.
Spinnmilben (Eier, Larven, Adulte)	●	●	●	●	●	●	Acramite 0,25 l/ha	3
Nutzinsekten (Treibhaus)	●	●	●	●	●	●	Siehe Einsatzplan Seite 103 oder fragen Sie den örtlichen LG-Berater.	

Getreide
Mais
Herbizid-Wirkungstabelle
Kartoffeln
Rüben Raps
Soja / Erbsen / Sonnenblumen
Feldbau div.
Futterkonservierung
Weinbau
Kernobst/Steinobst
Gemüse / Beeren
Zierpflanzenbau
Nutzlinge