Leu+Gygax AG

WF = Wartefrist in Tagen

## Karotten

**Silwet L-77** 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.

| | | | WF | |
|---|---|---|---|---|
| Einjährige Ungräser und Unkräuter | **Pendi** | 1-2 l/ha | | Vorauflauf (unmittelbar nach der Saat), keine oberflächige Saat. |
| Einjährige Ungräser und Unkräuter | **Laguna** | 2-3 l/ha | 80 | Vorauflauf (unmittelbar nach der Saat) plus 1.0 l/ha im Nachauflauf (BBCH 13). **(GWS)** |
| Einjährige Ungräser und Unkräuter | **Condoral SC** | 0,1-0,2 l/ha | | Anwendung: Stadium 10-16 BBCH. Splitbehandlung (max. 0,6 l/ha). **(GWS)** |
| Ungräser, Ausfallgetreide, Quecke | **Agil** | 0,75-2,5 l/ha | 28 | 2-2,5 l/ha gegen Quecke. |
| Alternaria-Möhrenschwärze | **Bonita** | 2-3 kg/ha | 21 | |
| Alternaria-Möhrenschwärze | **Cuproxat flüssig** BIO | 13-18 l/ha | 21 | |
| Alternaria-Möhrenschwärze | **Flowbrix** BIO | 4,5-7 l/ha | 21 | Höchstens 4 kg Kupfer-Metall je ha/Jahr. |
| Alternaria-Möhrenschwärze | **Kupfer Bordo LG** BIO | 13-18 kg/ha | 21 | Höchstens 4 kg Kupfer-Metall je ha/Jahr. 1. Behandlung bei Befallsbeginn, regelmässige Behandlungen in Abständen von 7-10 Tagen. |
| Alternaria-Möhrenschwärze | **Bogard** | 0,5 l/ha | 14 | Max. 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr. **(GWS)** |
| Alternaria-Möhrenschwärze Echter Mehltau | **Flint** | 0,4 kg/ha | 7 | Max. 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr. |
| Möhrenfliege | **Techno 10 CS** | 0,1 l/ha | 14 | Behandlungen nur während dem Flug im Abstand von mindestens 7 Tagen. **(GWS)** |
| Blattläuse, Erdraupen, Minierfliegen, Möhrenblattfloh, Thripse | **Techno 10 CS** | 0,1 l/ha | 14 | Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen. Maximal 2 Behandlungen pro Kultur. **(GWS)** |
| Blattläuse | **Pirimor** | 0,5 kg/ha | 7 | Max. 2 Behandlungen pro Kultur. **(GWS)** |
| Blattläuse, Thripse | **Siltac plus** TEAM BF | 0,15 % | | 2-3 Behandlungen im Abstand von etwa 7-10 Tagen. |
| Wachstumsförderung | **Kickstart** NEU | 0,15 l/ha | | Mehrmalige Anwendung. Spurennährstoff-Mischdünger enthält Zink und Fulvosäuren. |

## Knoblauch

| | | | WF | |
|---|---|---|---|---|
| Ungräser, Ausfallgetreide, Quecke | **Agil** | 0,75-2,5 l/ha | 56 | 2-2,5 l/ha gegen Quecke. |
| Einjährige Ungräser und Unkräuter | **Laguna** | 3 l/ha | 7 | Anwendung: Vorauflauf. Keine Anwendung auf Sandböden. **(GWS)** |
| Bodenbürtige Krankheiten | **Bonita WG** | 2-3 kg/ha | | Anwendung: Bis Stadium 12 (BBCH). Nur zur Anzucht von Jungpflanzen. |
| Purpurflecken, Rostpilze, Samtfleckenkrankheit | **Bogard** | 0,5 l/ha | 14 | Max. 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr. |
| Botrytis | **Papyrus** | 2 l/ha | 21 | Max. 1 Behandlung pro Kultur. |
| Falscher Mehltau | **Ridomil Gold** | 2,5 kg/ha | 21 | Max. 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr. **(GWS)** |
| Blattläuse, Erdraupen, Lauchmotten, Minierfliegen, Thripse | **Techno 10 CS** | 0,1 l/ha | 14 | Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen. Maximal 2 Behandlungen pro Kultur. **(GWS)** |
| Blattläuse, Thripse | **Siltac plus** TEAM BF | 0,15 % | 7 | 2-3 Behandlungen im Abstand von etwa 7-10 Tagen. |
| Blattläuse | **Pirimor** | 0,5 kg/ha | 14 | Max. 2 Behandlungen pro Kultur. **(GWS)** |
| Keimhemmung | **Fazor** | 3,5-4 kg/ha | | Ab Beginn des Knickens der Schäfte bis spät. 30 % geknickt. Hinweis Seite 69. |