

WF = Wartezeit in Tagen

4. Karotten

Slivwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.



Herbizid vor dem Auflaufen	Stomp Aqua	3 l/ha		Unmittelbar nach der Saat.
	Afalon	1–1,5 kg/ha		
Herbizid nach dem Auflaufen	Afalon + Condoral SC	1–1,5 kg/ha 0,1–0,2 l/ha		Ab 3. echtem Blatt der Karotten. Pro Splitbehandlung, max. Ausbringungsmenge 0,6 l/ha.
Ungräser, Ausfallgetreide, Quecke	Agil	0,75–2,5 l/ha	28	1,75–2,5 l/ha gegen Quecke.
Ungräser, Einj. Rispengras	Aramo	2 l/ha	28	Nur eine Anwendung pro Jahr.
Möhrenfliege	Techno	0,2 l/ha	14	Alle 8–10 Tage wiederholen während des Fluges.
Blattläuse	Pirimor	0,5 kg/ha	7	
Möhrenblattsauger (Möhrenblattfloh)	Techno	0,2 l/ha	14	
Eulenraupen	Pyrinex	3 l/ha	14	
Alternaria/Möhrenschwärze	Bonita WG NEU oder Bonita Rover Star Flowbrix oder Cuproxtat flüssig	2–3 kg/ha 3,5–5,5 l/ha 4 l/ha 4,5–7 l/ha 8–12 l/ha	21 21 21 21 21	1. Behandlung bei Befallsbeginn, regelmäßige Behandlungen im Abstand von 7–10 Tagen. Hochwertiges Kupferpräparat.
	Bogard	0,5 l/ha	14	Maximal 4 Behandlungen pro Jahr.
Alternaria	Proton	0,6–1,6 l/ha	21	Maximum 2 Behandlungen pro Jahr.
Wachstumsförderung	Fetrilon Combi	1 kg/ha		Als Zusatz zu Insektizid- oder Fungizid spritzungen.

5. Knoblauch

Ungräser, Ausfallgetreide, Quecke	Agil	0,75–2,5 l/ha	56	2–2,5 l/ha gegen Quecke.
Ungräser, Einj. Rispengras	Aramo	2 l/ha	28	Nur 1 Anwendung pro Jahr.
Purpurflecken, Rostpilze, Samtfleckenkrankheit	Bogard	0,5 l/ha	14	
Botrytis	Papyrus	2 l/ha	21	
Zwiebelmehltau	Ridomil Gold	2,5–3 kg/ha	21	
Keimhemmung	Fazor	3,5–4 kg/ha		20–30 % der Schäfte geknickt, 10–14 Tage vor der Krautvernichtung. Hinweis Seite 87.

Ranman® Top

Hochaktives Fungizid mit langer Dauerwirkung für Kartoffeln, Tomaten und Kürbisgewächse

- Protektiver Blattschutz mit langer Wirkungsdauer
- Regenfest innert kürzester Zeit
- Hervorragende Blattbenetzung für optimalen Schutz
- Schützt auch Neuzuwachs

