



			WF = Wartezeit in Tagen			
Karotten		Silwet L-77	0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.			
		Einjährige Ungräser und Unkräuter	Pendi	1-2 l/ha	80	Vorauflauf (unmittelbar nach der Saat), keine oberflächige Saat.
		Einjährige Ungräser und Unkräuter	Laguna	2-3 l/ha	80	Vorauflauf (unmittelbar nach der Saat) plus 1.0 l/ha im Nachauflauf (BBCH 13). (GWS)
	Einjährige Ungräser und Unkräuter	Condoral SC	0,1-0,2 l/ha		Anwendung: Stadium 10-16 BBCH. Splitbehandlung (max. 0,6 l/ha). (GWS)	
	Ungräser, Ausfallgetreide, Quecke	Agil	0,75-2,5 l/ha	28	2-2,5 l/ha gegen Quecke.	
	Alternaria-Möhrenschwärze	Bonita	2-3 kg/ha	21		
	Alternaria-Möhrenschwärze	Cuproxat flüssig	13-18 l/ha	21		
	Alternaria-Möhrenschwärze	Flowbrix	4,5-7 l/ha	21	Höchstens 4 kg Kupfer-Metall je ha/Jahr.	
	Alternaria-Möhrenschwärze	Kupfer Bordo LG	13-18 kg/ha	21	Höchstens 4 kg Kupfer-Metall je ha/Jahr. 1. Behandlung bei Befallsbeginn, regelmäßige Behandlungen in Abständen von 7-10 Tagen.	
	Alternaria-Möhrenschwärze	Bogard	0,5 l/ha	14	Max. 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr. (GWS)	
	Alternaria-Möhrenschwärze Echter Mehltau	Flint	0,4 kg/ha	7	Max. 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.	
	Möhrenfliege	Techno 10 CS	0,1 l/ha	14	Behandlungen nur während dem Flug im Abstand von mindestens 7 Tagen. (GWS)	
	Blattläuse, Erdraupen, Minierfliegen, Möhrenblattfloh, Thripse	Techno 10 CS	0,1 l/ha	14	Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen. Maximal 2 Behandlungen pro Kultur. (GWS)	
	Blattläuse	Pirimor	0,5 kg/ha	7	Max. 2 Behandlungen pro Kultur. (GWS)	
	Blattläuse, Thripse	Siltac plus	0,15 %		2-3 Behandlungen im Abstand von etwa 7-10 Tagen.	
Wachstumsförderung	Kickstart	0,15 l/ha		Mehrmalige Anwendung. Spurennährstoff-Mischdünger enthält Zink und Fulvosäuren.		
Knoblauch						
	Ungräser, Ausfallgetreide, Quecke	Agil	0,75-2,5 l/ha	56	2-2,5 l/ha gegen Quecke.	
	Einjährige Ungräser und Unkräuter	Laguna	3 l/ha	7	Anwendung: Vorauflauf. Keine Anwendung auf Sandböden. (GWS)	
	Bodenbürtige Krankheiten	Bonita WG	2-3 kg/ha		Anwendung: Bis Stadium 12 (BBCH). Nur zur Anzucht von Jungpflanzen.	
	Purpurflecken, Rostpilze, Samtfleckenkrankheit	Bogard	0,5 l/ha	14	Max. 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.	
	Botrytis	Papyrus	2 l/ha	21	Max. 1 Behandlung pro Kultur.	
	Falscher Mehltau	Ridomil Gold	2,5 kg/ha	21	Max. 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr. (GWS)	
	Blattläuse, Erdraupen, Lauchmotten, Minierfliegen, Thripse	Techno 10 CS	0,1 l/ha	14	Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen. Maximal 2 Behandlungen pro Kultur. (GWS)	
	Blattläuse, Thripse	Siltac plus	0,15 %	7	2-3 Behandlungen im Abstand von etwa 7-10 Tagen.	
	Blattläuse	Pirimor	0,5 kg/ha	14	Max. 2 Behandlungen pro Kultur. (GWS)	
	Keimhemmung	Fazor	3,5-4 kg/ha		Ab Beginn des Knickens der Schäfte bis spät. 30 % geknickt. Hinweis Seite 69.	