

Kohlarten

	Kohlarten						WF = Wartezeit in Tagen
	Weiss-, Rotkabis, Wirtz (Kopfkohle)	Rosenkohl	Kohlrabi	Chinakohl (Blattkohle)	Federkohl (Blattkohle)	Blumenkohl, Broccoli Romanesco (Blumenkohle)	
							<p>Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.</p>
Herbizid vor der Pflanzung	•	•	•	•	•	•	<p>Pendi 3,5 - 4,4 l/ha</p> <p>Nur möglich, wenn mit einer Bandsetzmaschine gepflanzt wird.</p>
Herbizid mit breiter Wirkung in gepflanzten Kohlarten	•	•	•	•	•	•	<p>Trax 1,5 - 2 l/ha</p> <p>Max. 1 kg Wirkstoff / ha. (GWS)</p>
Breitblättrige Unkräuter	•		•				<p>Lentagran 2 kg/ha</p> <p>28 3-4 Wochen nach der Pflanzung.</p>
Ungräser, Ausfallgetreide, Quecke	•	•	•	•	•	•	<p>Agil 0,75 - 2,5 l/ha</p> <p>56 2-2,5 l/ha gegen Quecke.</p>
Auflaufkrankheiten, Schwarzbeinigkeit	•	•	•	•	•	•	<p>Bonita WG 2 - 3 kg/ha</p> <p>Nach der Saat nur spritzen oder sprühen, nicht giessen!</p>
Falscher Mehltau	•	•	•	•	•	•	<p>Bonita WG 2 - 3 kg/ha</p> <p>Nur in der Setzlingsanzucht.</p>
Alternaria-Kohlschwärze Blattfleckenpilze Wurzelhals- und Stengelfäule	•		•	•	•	•	<p>Flint 0,4 kg/ha</p> <p>7 Maximal 3 Behandlungen mit einem Wirkstoff der gleichen Gruppe.</p>
Teilwirkung Falscher Mehltau		•					<p>Flint 0,4 kg/ha</p> <p>7</p>
Blattfleckenpilze	•	•	•	•	•	•	<p>Bogard 0,5 l/ha</p> <p>14 Maximal 4 Behandlungen pro Jahr. (GWS)</p>
Adernschwärze	•	•	•	•	•	•	<p>Flowbrix 🌱 oder Cuproxat flüssig 🌱</p> <p>0,2 % 0,4 %</p> <p>Nur zur Anzucht von Jungpflanzen. Cuproxat flüssig: Hochwertiges Kupferpräparat.</p>
Eulenraupen (blattfressend), Kohlschabe, Weisslinge.	•	•	•	•	•	•	<p>Rapid 1,5 kg/ha</p> <p>7 (GWS)</p>
Eulenraupen, Kohleule, Kohlschabe, Kohlweisslinge	•	•	•	•	•	•	<p>XenTari 🌱</p> <p>1 kg/ha</p> <p>7 Maximal 2 Behandlungen pro Jahr.</p>
Blattläuse (Röhrenläuse, Erdflöhe, Erdräupen, Eupenraupen (blattfressend) Kohldrehherzgallmücke, Kohlschabe, Minierfliegen, Thripse, Weisse Fliegen (Mottenschildläuse), Weisslinge.	•	•	•	•	•	•	<p>Techno 10 CS 0,1 l/ha</p> <p>14 (GWS)</p>
Blattläuse	•	•	•	•	•	•	<p>Pirimor 0,05 %</p> <p>7 Bei Auftreten. (GWS)</p>
Weisse Fliegen, Blattläuse, Spinnmilben	•	•	•	•	•	•	<p>Vista 🌱 2 % 20 l/ha</p> <p>7 Pflanzen allseitig gut benetzen, da Wirkung nur bei direktem Kontakt.</p>
Weisse Fliegen, Blattläuse, Spinnmilben, saugende Insekten	•	•	•	•	•	•	<p>Siltac plus 🌱 0,1 - 0,15 %</p> <p>Nur bei trockenem Wetter, tagsüber. Die Spritzbrühe muss schnell antrocknen.</p>
Organische Stickstoffdüngerlösung mit Pflanzenextrakte.	•	•	•	•	•	•	<p>Boundary SW 🌱 2,5 - 3,5 l/ha</p> <p>Fence N 🌱 1,5 - 3 l/ha</p> <p>Boundary SW und Fence N kräftigen die Pflanze insbesondere bei Insektenbefall.</p>
Calciummangel (Innenblattschwärze)	•	•	•	•	•	•	<p>Basfolier Combi STIPP 3 l/ha</p> <p>Tip-Calcium 🌱 1,5 - 3 l/ha</p> <p>Insbesondere China-, Blumen- und Rosenkohl min. 3 Behandlungen.</p>
Bormangel	•	•	•	•	•	•	<p>Micro Bor 🌱 3 l/ha</p> <p>Bei Bedarf wiederholen.</p>
Wachstumsförderung	•	•	•	•	•	•	<p>Fetrilon Combi 🌱 0,1 - 1 l/ha</p> <p>Als Zusatz zu Insektizid- oder Fungizidspritzungen.</p>
Mg-Mangel	•	•	•	•	•	•	<p>Olimag 0,4 - 0,6 %</p>
Vitalität und klimabedingte Stressbewältigung	•	•	•	•	•	•	<p>Polygrün 🌱 1 l/ha</p> <p>2 - 3 Behandlungen.</p>
	•	•	•	•	•	•	<p>Vital 🌱 1 l/ha</p> <p>2 - 3 Behandlungen.</p>
	•	•	•	•	•	•	<p>Penergetic p Gemüse 🌱 1 l/ha</p> <p>2 - 3 Behandlungen.</p>