

## Küchenkräuter

	Petersilie	Schnittlauch	Basilikum	Salbei	Dill	Kümmel	Rosmarin	Bohnenkraut	Liebstöckel	Estragon	WF = Wartezeit in Tagen			
Einjährige Ungräser	●										<b>Agil</b>	0,75-1,25 l/ha	21	Im Nachauflauf.
Einjährige Ungräser/Unkräuter	●										<b>Goltix 700 SC</b>	4,5 l/ha	40	Splitbehandlung ab BBCH 12.
Einjährige Ungräser/Unkräuter								●			<b>Goltix 700 SC</b>	4,5 l/ha		Splitbehandlung ab BBCH 14 (Freiland) im Aussaatjahr.
Einjährige Ungräser/Unkräuter						●					<b>Goltix 700 SC</b>	4,5 l/ha	40	Splitbehandlung. Bis BBCH 33 (Freiland).
Blattfleckenpilze	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	<b>Bogard</b>	0,5 l/ha	14	Maximal 3 Behandlungen.
Bodenbürtige Krankheiten	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	<b>Bonita WG</b>	0,2-0,3 % 2-3 kg/ha		Bis BBCH 12.
Fusarium spp., Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	<b>Prestop</b>	0,5 kg/ha		Giessen vor der Aussaat oder Pflanzung.
Falscher Mehltau	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	<b>Revus</b>	0,6 l/ha	7	Maximal 1 Behandlung (im Gewächshaus).
Falscher Mehltau	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	<b>Revus</b>	0,6 l/ha	7	Maximal 3 Behandlungen (im Freiland).
Falscher Mehltau	●										<b>Revus</b>	0,6 l/ha	7	Maximal 6 Behandlungen.
Falscher Mehltau	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	<b>Ridomil Gold</b>	2,5 kg/ha	21	Maximal 2 Behandlungen.
Blattläuse	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	<b>Pirimor</b>	0,5 kg/ha	7	Maximal 2 Behandlungen.
Blattsaugende Insekten	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	<b>Siltac plus</b>	0,1-0,15 %		5-7 Tage Abstand, bei Wiederholung.
Blattläuse, Erdflöhe, Erdraupen, Lauchmotte, Minierfliegen, Thripse, Möhrenblattfloh	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	<b>Techno 10 CS</b>	0,1 l/ha	7	Maximal 2 Behandlungen.
Blattläuse, Spinnmilben	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	<b>Vista</b>	2 % 20 l/ha	7	Pflanzen allseitig gut benetzen.
Acker- und Wegschnecken	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	<b>Amilon 5</b>	7 kg/ha		Keine essbaren Pflanzenteile bestreuen.
Maulwürfe, Wühl- und Schermaus	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	<b>Campa</b>	1-5 Patronen/Kolonie		Die Gänge sind gut abzudichten.
Pflanzenstärkung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	<b>Boundary SW</b>	2,5-3,5 l/ha		Anwendung Stadium BBCH 12-49.
Pflanzenstärkung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	<b>Fence N</b>	1,5-3 l/ha		Anwendung Stadium BBCH 12-49.
Magnesiumdünger	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	<b>Olimag</b>	0,4-0,8 %		Anwendung Stadium BBCH 12-49
Bodenfruchtbarkeit	●										<b>Penergetic b</b>	0,3-0,5/ha		Vor der Saat/Pflanzung.
Pflanzengesundheit	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	<b>Penergetic p Gemüse</b>	0,1 kg/ha		Mehrmals Wiederholen.
Pflanzengesundheit	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	<b>Vital</b>	1 l/ha		Effektive Mikroorganismen.
Bio-Stimulator	●										<b>HBR</b>	1-2 l/ha		Reduziert Witterungsstress.
Organisches Kaliumhumat	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	<b>LiqHumus 18</b>	35 l/ha		Verbessert die Bodenstruktur.
Bodenfruchtbarkeit	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	<b>Terrasan</b>	1,5-5 l/ha		Effektive Mikroorganismen.
Bio-Stimulator	●										<b>Polygrün</b>	1,5-3 l/ha		Algenextrakt.
Blattdünger	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	<b>Basfoliar Combi STIPP</b>	0,2-0,4 %		Calciumdünger.
Blattdünger	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	<b>Fetrilon-Combi 1</b>	1 kg/ha		Spurenelemente.

Getreide  
Mais  
Herbizid-Wirkungstabelle  
Kartoffeln  
Rüben/Raps  
Soja / Erbsen / Sonnenblumen  
Feldbau div.  
Futterkonservierung  
Weinbau  
Kernobst/Steinobst  
Gemüse / Beeren  
Zierpflanzenbau  
Nützlinge