


9. Lauch

WF = Wartezeit in Tagen

Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.



Herbizid nach der Pflanzung	Spark	2 kg/ha		
	Lentagran	2 kg/ha	28	Ab 3. Blattstadium.
Ungräser, Ausfallgetreide, Quecke	Agil	0,75–2,5 l/ha	56	1,75–2,5 l/ha gegen Quecke.
Purpurflecken, Rostpilze, Samtfleckenkrankheit	Bogard	0,5 l/ha	14	Maximal 4 Behandlungen pro Jahr.
Blattläuse (Röhrenläuse), Erdräupen, Lauchmotte, Minierfliegen, Thripse	Techno 10 CS NEU	0,1 l/ha	14	Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen. Maximal 3 Behandlungen mit diesem Wirkstoff.
Lauchmotte	XenTari 	1 kg/ha	7	



10. Petersilie



Ungräser, Ausfallgetreide,	Agil	0,75–2,5 l/ha	56	2–2,5 l/ha gegen Quecke.
Auflaufkrankheiten im Keimlingsstadium	Bonita WG	0,3 %		Überspritzen, nicht giessen.
Falscher Mehltau	Ridomil Gold	2,5 kg/ha	21	Maximal 2 Behandlungen: 1. Behandlung bei Befallsbeginn, 2. nach 3 Wochen.
Alternaria, Septoria-Blattfleckkrankheit	Bogard	0,5 l/ha	21	Maximal 4 Behandlungen pro Jahr. Behandlung bis 1 Woche nach dem Schnitt.
Wachstumsförderung (Qualitätsverbesserung)	Basfoliar Combi <small>STIPP</small>	0,2–0,3 %		Bei Bedarf wiederholen.
Mg-, Fe-Mangel	Fetrilon Combi	1 kg/ha		Nur im Freiland anwenden.
Blattläuse (Röhrenläuse), Erdräupen, Lauchmotte, Minierfliegen, Thripse	Techno 10 CS NEU	0,1 l/ha	14	Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen. Maximal 3 Behandlungen mit diesem Wirkstoff.

11. Randen



Herbizid vor dem Auflaufen	Pyrazon oder Spark	3–4 kg/ha 1,5–2 kg/ha		Nach der Saat vor dem Auflaufen, Moorböden bis 3–3,5 kg/ha.
Herbizid nach dem Auflaufen	Goltix Gold + Belvedere Forte	1 l/ha 0,3-0,5 l/ha		Pro Splitbehandlung.
Blattläuse (Röhrenläuse), Erdräupen, Lauchmotte, Minierfliegen, Thripse	Techno 10 CS NEU	0,1 l/ha	14	Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen. Maximal 2 Behandlungen mit diesem Wirkstoff.
Eulenraupen	Pyrinex	3 l/ha	14	
Cercospora- + Ramularia-	Bogard	0,5 l/ha	14	Maximal 4 Behandlungen pro Jahr.
	Flowbrix  oder Cuproxtat flüssig 	4,5–7 l/ha 8–12 l/ha	21	1. Behandlung bei Befallsbeginn, regelmäßige Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. Hochwertiges Kupferpräparat.
Bormangel	Micro Bor 	3 l/ha		Bei Bedarf wiederholen.
Mn-Mangel	MaxMan 400	1 l/ha		Speziell in Moorböden. Insbesondere bei Wetterstress.