



	Produkt	Anwendung	Hinweise
Brachen und Stoppelfelder			
Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.			
Herbizide:			
Brache, Frässaaten, Mulchsaaten	Glifonex TF	2-3 l/ha 4-6 l/ha 4-10 l/ha	Einjährige Unkräuter und Ungräser. Mehrjährige Gräser. Mehrjährige Unkräuter, bei Winden 10 l/ha verwenden.
Brache, Frässaaten, Mulchsaaten	Roundup Turbo/Profi	1,5-2,5 l/ha 3-5 l/ha 3-7,5 l/ha	Einjährige Unkräuter und Ungräser. Mehrjährige Gräser. Mehrjährige Unkräuter, bei Winden 7,5 l/ha verwenden.
bei Winden, Blacken, Disteln	+ Dialen	0,5 l/ha	In Tankmischung mit 5 l/ha Glifonex oder 4 l/ha Roundup Profi/Turbo. Letzte Anwendung Ende September.
Lein (Flachs)			
Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.			
Herbizide:			
Unkräuter	Effican SG NEU	1,1 kg/ha	Nachauflauf: im 2-4 Blattstadium der Unkräuter ab 5 cm der Kultur. Effican SG darf nicht in der Grundwasserschutzzone S2 werden.
Starterdünger	Level 2	0,8 l/ha 	5 cm Kulturhöhe. Mischbar mit Herbiziden.
Erdräupen	Techno 10 CS	0,075 l/ha	
Wiesen und Weiden			
Herbizide:			
a) Neusaaten	MCPB LG + Effican SG NEU	2 l/ha 1,1 kg/ha	In Neusaaten vor dem 1. Schnitt. Der Klee muss 2 echte Blätter aufweisen. Wartefrist: 3 Wochen, Galttiere 2 Wochen.
Mit jungen Blackensämlingen	MCPB LG + Asulam LG	4 l/ha 1 l/ha	Ab 2-Blatt-Stadium des Klees. Keine Anwendung in Alexandriner oder Perserklee Wartefrist: 3 Wochen, Galttiere 2 Wochen.
Kleegrasmischungen	Lentagran	1 - 2 kg/ha	Im Herbst bis Mitte Oktober. Wartefrist: 3 Wochen, Galttiere 2 Wochen.
Luzerne	Effican SG NEU	2 x 0,55 kg/ha	Splitbehandlung. Effican SG darf nicht in der Grundwasserschutzzone S2 eingesetzt werden.
Starterdünger	Level 2	0,8 l/ha 	Behandlung wenn Klee 4 echte Blätter hat. Mischbar mit Herbiziden.
b) Flächenbehandlung:			
Blacken	Asulam LG + Flüssigdünger	4 l/ha 4 l/ha	Anwendung Frühling und Herbst. Vor Bildung der Blütenstände. Wartefrist: 3 Wochen, Galttiere 2 Wochen.
Alpenblacken, Farne	Asulam LG + Flüssigdünger	4 l/ha 4 l/ha	Flüssigdünger fördert die Wirkung. Wartefrist: 3 Wochen, Galttiere 2 Wochen.
Blackensämlinge und andere breitblättrige Unkräuter	MCPB LG	4 - 6 l/ha	In Kleegras-Neusaaten und Einsaaten vor 1. Schnitt. Der Klee muss 2 echte Blätter entwickelt haben. Behandlung bei wüchsigen Wetter. Wartefrist: 3 Wochen, Galttiere 2 Wochen.
Disteln	Duplosan KV Combi	2,5 - 3,25 l/ha	
c) Einzelstockbehandlung			
Blacken, Bärenklau, Kerbel, Brennessel, St. Jakobskreuzkraut u.a.	Blackex	Mischverhältnis 1:2	Enthält roten Farbstoff zum besseren Erkennen behandelter Pflanzen. Anwendung mit Sprüh- und Spritzgeräten. Wartefrist: 3 Wochen, Galttiere 2 Wochen.
Giftige Kreuzkräuter, Weisses Germer	Zwei 4-D + Duplosan KV Combi	0,4 - 0,5 % 1 - 10 %	
Blacken	Asulam LG	4 l/ha	Wartefrist: 3 Wochen, Galttiere 2 Wochen.
Biodiversitätsförderflächen (BFF) gemäss DZV			
Herbizide:	Glifonex TF Roundup Turbo/Profi	5 - 10 % 5 - 7,5 %	Ausbringung mit Handspritzgeräten ohne Rückenspritze.