Mais

Leu+Gygax AG

	Einsatz in Karstgebieten / ohne Terbuthylazin	Geeignet für Fräs- und Mulchsaaten	Vor der Saat	Saat	Auflaufen (09)	1-Blatt (11)	3-Blatt (13)	6-Blatt (16)	8-Blatt (18)	Empfehlungen
Herbizidstrategien				**Silwet L-77** 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.						
Standardvariante bei Hirsen, Quecken, Raygräser, Zyperngras (Erdmandelgras).		●				**Lumax** 3–4 l/ha	**+ Dasul Extra 6 OD** 0,75 l/ha			Bei starkem Hirsedruck früh behandeln.
Standardvariante bei Blacken, Disteln, Winden Zyperngras (Erdmandelgras).		●				**Lumax** 3–4 l/ha	**+ Dialen** 0,5 l/ha			
Direkt-, Fräs- und Mulchsaat.		●	**Glifonex** oder **Roundup Profi/ Turbo**			**Dasul Extra 6 OD** 0,75 l/ha	**+ Lumax** 3 l/ha	**+ Dialen** 0,5 l/ha		Zusatz von Dialen bei Blacken, Disteln, Winden.
Karst- oder terbuthylazinfreie Variante.	●	●				**Dasul Extra 6 OD** 0,75 l/ha	**+ Frontier X2** 1,4 l/ha	**+ Biathlon** 70 g/ha oder **Dialen** 0,5 l/ha		Dialen anstelle von Biathlon bei Blacken, Disteln, Winden.
inkl. Erdmandelgras	●	●				**Arigo** 330 g/ha	**+ Codacide** 1–2 l/ha	**+ Frontier X2** 1–1,2 l/ha		Mischbar mit Dialen.
Unkrautbekämpfung										
Zwischenfrüchte sowie vorhandene Unkräuter und Ungräser.	●	●	**Glifonex** 5–8 l/ha							Zum Abbrennen von Zwischenfrüchten, Gründüngungen und Unkräutern (inkl. Blacken und Quekken) bis 2 Wochen vor der Bodenbearbeitung. ÖLN-Auflagen beachten.
	●	●	**Roundup Profi / Turbo** 4–6 l/ha							
Ungräser inkl. Hirsen, Quecken und einjährige Samenunkräuter inkl. Melden, Amarant.		●			**Prado Plus** 3 l/ha Prado + 250 g/ha Arigo + 1 l/ha Codacide					Kombination mit sehr breiter Wirkung.
Einj. Ungräser inkl. Hirsen und einjährige Samenunkräuter **Terbuthylazinfreie Variante.**	●			**Stomp Aqua** 3–4 l/ha			**Biathlon + Silwet L-77** 70 g/ha			Bei Blacken Biathlon mit Dialen mischbar. Biathlon darf nicht in der Grundwasserschutzzone S2 eingesetzt werden.
Ein- und mehrjährige Ungräser und Unkräuter und Zyperngras (Erdmandelgras).		●		**Lumax** 4 l/ha						Sehr breite Wirkung. Früh behandeln. Nachbau: Etikettentext beachten. Lumax darf nicht in Karstgebieten eingesetzt werden.
Amarant, Hirsen, Raygras und **Zyperngras (Erdmandelgras).**	●	●				**Arigo** 330 g/ha	**+ Codacide** 2 l/ha			Mischbar mit Dialen und Biathlon.
Blacken, Disteln, **Winden.**	●	●				**Dialen** 0,3–0,6 l/ha				
Winden, Disteln, Schachtelhalm und Zyperngras (Erdmandelgras)	●	●					**Zwei 4-D** 1–1,2 l/ha			Speziell für Nesterbehandlung. Nicht bei Hitze und nur auf die trockene Pflanzen spritzen. Maishöhe 10-15 cm. Gewisse Sorten können empfindlich reagieren.
Amarant, Gänsefuss, Klebern, Melde, Schwarzer Nachtschatten, Zweizahn Zyperngras (Erdmandelgras).	●	●					**Lentagran** 1,5–2 kg/ha			Ab 2-Blattstadium, mischbar mit Lumax.
Einjährige Unkräuter und gegen Zyperngras (Erdmandelgras).	●	●					**Effican** 2 l/ha			Effican darf nicht in der Grundwasserschutzzone S2 eingesetzt werden.
Winden	●	●						**Biathlon** 70 g/ha **+ Codacide** 2 l/ha		Genügend Bodenfeuchte nötig. Biathlon darf nicht in der Grundwasserschutzzone S2 eingesetzt werden.
Schädlingsbekämpfung										
Erdraupen					**Techno** 0,15 l/ha					Wartefrist: 6 Wochen. Mischbar mit Herbiziden und Flüssigdüngern LG. Nur abends und mit hoher Brühemenge behandeln.
Schnecken					**Amilon 5** 5-7 kg/ha NEU					
Blattdüngung										
Manganmangel						**MaxMan 400** 1 l/ha				Moorböden, 2-3 x spritzen.
Starter und Booster für starke Wurzelbildung.						**Level 2** 1,2 l/ha				Mischbar mit Herbiziden.
Wachstumsförderung						**Folifert Super** 4–6 kg/ha od. **Flüssigdünger LG** 2–5 l/ha				Mischbar mit Herbiziden und Insektiziden LG.

Einsilieren	**Mais-Kofasil**	**Mais-Kofasil liquide**	**Kofa Grain pH 5**	**Kofasil S**	
	Sofort verfütterbar	Sofort verfütterbar	Sofort verfütterbar	Sofort verfütterbar	Mit Kofasil S behandelte Silagen sollten min. 8 Wochen verschlossen bleiben, um die volle Wirkung zu erhalten.
Siliergut	je m³ Silage gesetzt	je Tonne Frischmasse	je Tonne Frischmasse	je Tonne	
Mais	1,2 - 1,5 kg/m³	3,5 - 4,5 l	3 - 5 l	1 g (auch CCM einsetzbar)	Verhindert und bekämpft Nachgärungen und Schimmelbildung. Auch bei CCM einsetzbar.
Behandlung bei nachträglicher Erwärmung.	**je m²** 0,4 - 0,6 kg Bestreuen und mit 5-10 l Wasser/m² einspülen.	**je m²** 1,2 - 1,5 l in 5 - 10 l Wasser auflösen	0,4 - 0,6 l		
Oberflächenbehandlung (Oberfläche, Ränder)			0,4 - 0,6 l	1 g	4-6 Schichten à 20-25 cm Schichtstärke.
Konservierung von feuchtem Körnermais.			1,1 - 2 l/100 kg		Je nach Konservierungsdauer und Feuchtigkeitsgehalt der Maiskörner, z.B.: ● Lagerdauer 1-3 Monate = 1,1 - 1,6 l/100 kg ● Lagerdauer 6-12 Monate = 1,5 - 2 l/100 kg
Maiskolbenprodukte (LKS, CCM, Feuchtmaisschrot).		3 - 5 l			

= ÖLN: Beachten Sie den ökologischen Leistungsnachweis der für Ihr Gebiet zuständigen Kommission.