

Lein (Flachs)	Produkt	Anwendung	Hinweise
Herbizide:	Silwet L-77	0,1 l/ha	in jede Spritzung bei reduzierten Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.
Unkräuter und Gräser	Speleo	25 g/ha	Nachauflauf ab 5 cm der Kultur.
Unkräuter	Basagran SG NEU oder Effican	1,1 kg/ha 2 l/ha	Nachauflauf: im 2–4 Blattstadium der Unkräuter ab 5 cm der Kultur. Basagran/Effican darf nicht in der Grundwasser schutzzone S2 eingesetzt werden.
Starter und Booster	Level 2	0,8 l/ha	5 cm Kulturhöhe. Mischbar mit Herbiziden.
Erdräupen	Techno	0,15 l/ha	
Wiesen und Weiden			
Herbizide:			
a) Neusaaten	MCPB LG + Basagran SG oder Effican NEU	2 l/ha 0,55 kg/ha 1 l/ha	In Neusaaten vor dem 1. Schnitt. Der Klee muss 2 echte Blätter aufweisen. Wartefrist: 3 Wochen, Galttiere 2 Wochen.
Mit jungen Blacken	MCPB LG + Asulam LG	4 l/ha 1 l/ha	Ab 2-Blatt-Stadium des Klees. Keine Anwendung in Alexandriner oder Perserklee. Wartefrist: 3 Wochen, Galttiere 2 Wochen.
Kleegramischungen	Lentagran	1–2 kg/ha	Im Herbst bis Mitte Oktober. Wartefrist: 3 Wochen. Galttiere 2 Wochen.
Luzerne	Effican NEU	2 x 1 l/ha	Splitbehandlung. Effican darf nicht in der Grundwasserschutzzone S2 eingesetzt werden.
Starter und Booster	Level 2	0,8 l/ha	Im Stadium 4 echte Blätter. Mischbar mit Herbiziden.
b) Flächenbehandlung:			
Blacken	Asulam LG	4 l/ha	Anwendung Frühling oder Herbst. Vor Bildung der Blütenstände. Wartefrist: 3 Wochen, Galttiere 2 Wochen. Flüssigdünger fördert die Wirkung.
Alpenblacken, Farne	Asulam LG + Flüssigdünger LG	6–8 l/ha 4 l/ha	Wartefrist: 3 Wochen, Galttiere 2 Wochen.
Alte Blackenstöcke, Sumpfkresse, Winden	Banvel Extra	5–6 l/ha	Flächenbehandlung vor Umbruch. Bei Einzelstockbehandlungen 1%-ig. Wartefrist: 3 Wochen, Galttiere 2 Wochen.
Blackensämlinge und andere breitblättrige Unkräuter.	MCPB LG	4–6 l/ha	In Klee gras-Neusaaten und Einsaaten vor dem 1. Schnitt. Der Klee muss 2 echte Blätter entwickelt haben. Behandlung bei wüchsigem Wetter vor Erscheinen der Blütenstiele durchführen. Wartefrist: 3 Wochen, Galttiere 2 Wochen.
Fadenförmiger Ehrenpreis Disteln	Stomp Aqua Duplosan KV Combi	3,5 l/ha 2,5–3,25 l/ha	Im Herbst nach der letzten Nutzung.
c) Einzelstockbehandlung			
Blacken, Bärenklau, Kerbel, Brennessel, St. Jakobskreuzkraut u.a.	Blackex	Mischverhältnis 1:2	Enthält roten Farbstoff zum besseren Erkennen behandelter Pflanzen. Anwendung mit Sprüh- und Spritzgeräten. Wartefrist: 3 Wochen, Galttiere 2 Wochen.
Giftige Kreuzkräuter, Weisses Germer	Zwei 4-D Duplosan KV Combi	0,4–0,5 % 0,5–1 %	Einzelstockbehandlung.
Blacken	Asulam LG	1%	Wartefrist: 3 Wochen, Galttiere 2 Wochen.
Blacken, Disteln, Winden	Dialen	0,5 l/ha	In Tankmischung mit 5 l/ha Glifonex oder 4 l/ha Roundup Profi/Turbo. Letzte Anwendung Ende September.
Brache und Stoppelfelder			
Herbizide:			
Brache, Feldsaaten, Mulchsaaten	Glifonex	2–3 l/ha 4–6 l/ha 4–10 l/ha	Einjährige Unkräuter und Ungräser. Mehrjährige Gräser. Mehrjährige Unkräuter, bei Winden 10 l/ha verwenden.
Brache, Feldsaaten, Mulchsaaten	Roundup Turbo/Profi	1,5–2,5 l/ha 3–5 l/ha 3–7,5 l/ha	Einjährige Unkräuter und Ungräser. Mehrjährige Gräser. Mehrjährige Unkräuter, bei Winden 7,5 l/ha verwenden.
bei Winden, Blacken, Disteln	+ Dialen	0,5 l/ha	
Ökologische Ausgleichsflächen gemäss StoV			
Herbizide:	Glifonex Roundup Turbo/Profi	5–10% 5–7,5%	Ausbringung mit Handspritzgeräten ohne Rückenspritze.