

WF = Wartezeit in Tagen

**Silwet L-77** 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.

## 9. Lauch



Herbizid nach der Pflanzung	<b>Spark</b> 2 kg/ha	
	<b>Lentagran</b> 2 kg/ha	28 Ab 3. Blattstadium.
Ungräser, Ausfallgetreide, Quecke	<b>Agil</b> 0,75–2,5 l/ha	56 1,75–2,5 l/ha gegen Quecke.
Ungräser, <b>Einj. Rispengras</b>	<b>Aramo</b> 2 l/ha	28 Nur 1 Anwendung pro Jahr.
Purpurflecken, Rostpilze, Samtfleckenkrankheit	<b>Bogard</b> 0,5 l/ha	14 Maximal 4 Behandlungen pro Jahr.
Lauchmotte / Thrips	<b>Techno</b> 0,2 l/ha	14 Zur Thripsbehandlung jedes Mal das Mittel wechseln und Netzmittel resp. bei reduzierten Wassermengen Silwet L-77 beimischen
Lauchmotte	<b>XenTari</b> 1 kg/ha	7

## 10. Petersilie



Unkräuter und Ungräser	<b>Stomp Aqua</b> 2 l/ha	
Ungräser, Ausfallgetreide,	<b>Agil</b> 0,75–2,5 l/ha	56 2–2,5 l/ha gegen Quecke.
Auflaufkrankheiten im Keimlingsstadium	<b>Bonita WG</b> 0,3 %	Überspritzen, nicht giessen.
Falscher Mehltau	<b>Forum</b> 1,3 l/ha	21 Ab Befallsbeginn, maximal 3 Behandlungen.
	<b>Ridomil Gold</b> 2,5 kg/ha	21 Maximal 2 Behandlungen: 1. Behandlung bei Befallsbeginn, 2. nach 3 Wochen.
Alternaria, Septoria-Blattfleckenkrankheit	<b>Bogard</b> 0,5 l/ha	21 Maximal 4 Behandlungen pro Jahr. <b>Behandlung bis 1 Woche nach dem Schnitt.</b>
Wachstumsförderung (Qualitätsverbesserung)	<b>Basfoliar Combi STIPP</b> 0,2–0,3 %	Bei Bedarf wiederholen.
Mg-, Fe-Mangel	<b>Fetrilon Combi</b> 1 kg/ha	Nur im Freiland anwenden.

## 11. Randen



Herbizid vor dem Auflaufen	<b>Pyrazon</b> 3–4 kg/ha oder <b>Spark</b> 1,5–2 kg/ha	
Herbizid nach dem Auflaufen	<b>NEU Goltix Gold</b> 1 l/ha + <b>Belvedere Forte</b> 0,3-0,5 l/ha	Pro Splitbehandlung.
Blattläuse, Erdflöhe, Erdraupen, Thripse	<b>Techno</b> 0,2 l/ha	14
Eulenraupen	<b>Pyrinex</b> 3 l/ha	14
Cercospora- + Ramularia-	<b>Bogard</b> 0,5 l/ha	14 Maximal 4 Behandlungen pro Jahr.
	<b>Flowbrix</b> 4,5–7 l/ha oder <b>Cuproxat flüssig</b> 8–12 l/ha	21 1. Behandlung bei Befallsbeginn, regelmäßige Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. Hochwertiges Kupferpräparat.
Bormangel	<b>Micro Bor</b> 3 l/ha	Bei Bedarf wiederholen.
Mn-Mangel	<b>MaxMan 400</b> 1 l/ha	Speziell in Moorböden.