

WF = Wartezeit in Tagen

Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.

9. Lauch



Herbizid nach der Pflanzung	Spark 2 kg/ha	
	Lentagran 2 kg/ha	28 Ab 3. Blattstadium.
Ungräser, Ausfallgetreide, Quecke	Agil 0,75–2,5 l/ha	56 1,75–2,5 l/ha gegen Quecke.
Ungräser, Einj. Rispengras	Aramo 2 l/ha	28 Nur 1 Anwendung pro Jahr.
Purpurflecken, Rostpilze, Samtfleckenkrankheit	Bogard 0,5 l/ha	14 Maximal 4 Behandlungen pro Jahr.
Lauchmotte / Thrips	Techno 0,2 l/ha	14 Zur Thripsbehandlung jedes Mal das Mittel wechseln und Netzmittel resp. bei reduzierten Wassermengen Silwet L-77 beimischen
Lauchmotte	XenTari 1 kg/ha	7

10. Petersilie



Unkräuter und Ungräser	Stomp Aqua 2 l/ha	
Ungräser, Ausfallgetreide,	Agil 0,75–2,5 l/ha	56 2–2,5 l/ha gegen Quecke.
Auflaufkrankheiten im Keimlingsstadium	Bonita WG 0,3 %	Überspritzen, nicht giessen.
Falscher Mehltau	Forum 1,3 l/ha	21 Ab Befallsbeginn, maximal 3 Behandlungen.
	Ridomil Gold 2,5 kg/ha	21 Maximal 2 Behandlungen: 1. Behandlung bei Befallsbeginn, 2. nach 3 Wochen.
Alternaria, Septoria-Blattfleckenkrankheit	Bogard 0,5 l/ha	21 Maximal 4 Behandlungen pro Jahr. Behandlung bis 1 Woche nach dem Schnitt.
Wachstumsförderung (Qualitätsverbesserung)	Basfoliar Combi STIPP 0,2–0,3 %	Bei Bedarf wiederholen.
Mg-, Fe-Mangel	Fetrilon Combi 1 kg/ha	Nur im Freiland anwenden.

11. Randen



Herbizid vor dem Auflaufen	Pyrazon 3–4 kg/ha oder Spark 1,5–2 kg/ha	
Herbizid nach dem Auflaufen	NEU Goltix Gold 1 l/ha + Belvedere Forte 0,3-0,5 l/ha	Pro Splitbehandlung.
Blattläuse, Erdflöhe, Erdraupen, Thripse	Techno 0,2 l/ha	14
Eulenraupen	Pyrinex 3 l/ha	14
Cercospora- + Ramularia-	Bogard 0,5 l/ha	14 Maximal 4 Behandlungen pro Jahr.
	Flowbrix 4,5–7 l/ha oder Cuproxat flüssig 8–12 l/ha	21 1. Behandlung bei Befallsbeginn, regelmäßige Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. Hochwertiges Kupferpräparat.
Bormangel	Micro Bor 3 l/ha	Bei Bedarf wiederholen.
Mn-Mangel	MaxMan 400 1 l/ha	Speziell in Moorböden.