


## Lauch



		WF = Wartezeit in Tagen	
Herbizid nach der Pflanzung	<b>Spark</b>	2 kg/ha	(GWS)
	<b>Lentagran</b>	2 kg/ha	28 Ab 3-Blattstadium.
Ungräser, Ausfallgetreide, Quecke	<b>Agil</b>	0,75-2,5 l/ha	56 2-2,5 l/ha gegen Quecke.
Ungräser und Unkräuter	<b>Pendi</b>	2,4 l/ha	Lauch gesät. Im Voraufbau.
Ungräser und Unkräuter	<b>Pendi</b>	4-5 l/ha	Lauch gepflanzt. Vor der Pflanzung.
Purpurflecken, Rostpilze, Samtfleckenkrankheit	<b>Bogard</b>	0,5 l/ha	14 Maximal 4 Behandlungen pro Jahr. (GWS)
Alternaria spp. Lauchrost, Papierfleckenkrankheit, Samtfleckenkrankheit	<b>Flint</b>	0,4 kg/ha	Maximal 2 Behandlungen. Stadium 41-49 (BBCH).
Blattläuse (Röhrenläuse), Erdraupen, Lauchmotte, Minierfliegen, Thripse	<b>Techno 10 CS</b>	0,1 l/ha	14 Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen. Max. 3 Behandlungen mit diesem Wirkstoff. (GWS)
Lauchmotte	<b>XenTari</b>	1 kg/ha	7
Blattsaugende Insekten	<b>Siltac plus</b>	0,15 %	Die Spritzbrühe muss schnell antrocknen.
Magnesiumdünger	<b>Olimag</b>	0,4-0,8 %	Anwendung: Stadium BBCH 12 bis 49.
Pflanzenstärkung	<b>Boundary SW</b>	2,5-3,5 l/ha	Anwendung: Stadium BBCH 12 bis 49.

## Randen



Einj. Gräser und Unkräuter	<b>Oblix MT</b>	6 l/ha	Splitbehandlung
Herbizid vor dem Auflaufen	<b>Spark</b>	1,5-2 kg/ha	Nach der Saat vor dem Auflaufen. (GWS)
Herbizid nach dem Auflaufen	<b>NEU Beta Team + Goltix 700 SC</b>	1,25 + 1,5 + 1,5 l/ha 1 l/ha	pro Splitbehandlung.
Ausfallgetreide, Einjährige Gräser und Quecken	<b>Agil</b>	0,75-2,5 l/ha	56
Cercospora- und Ramularia Blattfleckenkrankheiten	<b>Bogard</b>	0,5 l/ha	14 Max. 4 Behandlungen pro Jahr. (GWS)
	<b>Flowbrix</b> oder <b>Cuproxtat flüssig</b>	4,5-7 l/ha 8-12 l/ha	21 1. Behandlung bei Befallsbeginn, regelmäßige Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. Hochwertiges Kupferpräparat.
	<b>Kupfer Bordo LG</b>	13-18 kg/ha	21 Höchstens 4 kg Kupfer-Metall je Hektare und Jahr.
Blattläuse (Röhrenläuse), Erdraupen, Lauchmotte, Minierfliegen, Thripse	<b>Techno 10 CS</b>	0,1 l/ha	14 Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen. Max. 2 Behandlungen mit diesem Wirkstoff. (GWS)
Blattläuse	<b>Pirimor</b>	0,5 kg/ha	7 Max. 2 Behandlungen pro Kultur. (GWS)
Blattsaugende Insekten	<b>Siltac plus</b>	0,15 %	Die Spritzbrühe muss schnell antrocknen.
Magnesiumdünger	<b>Olimag</b>	0,4-0,8 %	Anwendung: Stadium BBCH 12 bis 49.
Pflanzenstärkung	<b>Boundary SW</b>	2,5-3,5 l/ha	28 Anwendung: Stadium BBCH 12 bis 49.
Pflanzenstärkung	<b>Fence N</b>	1,5-3 l/ha	56 Anwendung: Stadium BBCH 12 bis 49.
Bormangel	<b>Micro Bor</b>	3 l/ha	Bei Bedarf wiederholen.
Mn-Mangel	<b>MaxMan 400</b>	1 l/ha	Speziell in Moorböden. <b>Insbesondere bei Wetterstress.</b>