




## 12. Rettich, Radies, Mairüben, Herbstrüben

	Radies	Rettich	Mairüben	Herbstrüben	WF = Wartefrist in Tagen			
	●	●	●	●	<b>Silwet L-77</b>	0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.		
Auflaufkrankheiten im Keimlingsstadium	●	●	●	●	<b>Bonita WG</b>	0,3 %	Überspritzen, nicht giessen.	
Herbizid nach der Saat	●	●			<b>Trax</b>	1 l/ha	Speziell in Sommerkultur im Freiland.	
Falscher Mehltau, Weissler Rost (Teilw.)	●				<b>Bion</b>	30-60 g/ha	7	
Blattläuse (Röhrenläuse), Erdflöhe, Erdraupen, Minierfliegen, Thripse	●	●	●	●	<b>Techno 10 CS</b> <b>NEU</b>	0,1 l/ha	14	Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen. Maximal 2 Behandlungen mit diesem Wirkstoff.
Eulenraupen	●	●	●	●	<b>Pyrinex</b>	3 l/ha	21	
Schnecken	●	●	●	●	<b>Amilon 5</b>	5-7 kg/ha		Ab Keimblatt streuen.

## 13. Rhabarber

					<b>Silwet L-77</b>	0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.
	Einj. Rispengras, Quecke	<b>Agil</b>	0,75-2,5 l/ha			2,5 l/ha gegen Einj. Rispengras. Nach der Ernte.
	Blattflecken	<b>Bogard</b>	0,5 l/ha	14		
	Falscher Mehltau	<b>Ridomil Gold</b>	0,5 kg/ha			Maximal 3 Behandlungen: Bis spätestens Ende August. Nach der Ernte.
	Falscher Mehltau	<b>Virexa</b>	2,5 kg/ha			Maximal 3 Behandlungen: Bis spätestens Ende August. Nach der Ernte.
	Eulenraupen	<b>Pyrinex</b>	3 l/ha			Anwendung: nur nach der Ernte. Maximal 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr mit diesem Wirkstoff.
	Blattläuse (Röhrenläuse), Erdflöhe, Erdraupen, Minierfliegen, Thripse	<b>Techno 10 CS</b> <b>NEU</b>	0,1 l/ha	14		Behandlung im Abstand von 7-14 Tagen, Maximal 2 Behandlungen mit diesem Wirkstoff.
	Blattläuse	<b>Pirimor</b>	0,5 kg/ha	7		
	Blattläuse (Röhrenläuse), Erdflöhe, Erdraupen, Minierfliegen, Thripse	<b>Techno 10 CS</b> <b>NEU</b>	0,1 l/ha	14		Behandlung im Abstand von 7-14 Tagen, Maximal 2 Behandlungen mit diesem Wirkstoff.

## 14. Schnittlauch

	Ungräser, Einj. Rispengras	<b>Goltix 700 SC</b>	1,5 l/ha	42		Ab Stadium BBCH 12. Splitbehandlung: 3 x 1,5 l/ha. Total max. 4,5 l/ha.
	Samtfleckenkrankheit, (Cladosporium)	<b>Bogard</b>	0,5 l/ha	14		Maximal 4 Behandlungen pro Jahr. Behandlung bis 1 Woche nach dem Schnitt.
	Blattläuse (Röhrenläuse), Erdflöhe, Erdraupen, Minierfliegen, Thripse	<b>Techno 10 CS</b> <b>NEU</b>	0,1 l/ha	14		Behandlung im Abstand von 7-14 Tagen, Maximal 2 Behandlungen mit diesem Wirkstoff.