

## Radies, Rettich, Meerrettich, Speisekohlrüben

Herbizid	Radies	Rettich	Merrettich	Speisekohlrüben	Wirkstoff	Dosis	WF	Anwendung	WF = Wartezeit in Tagen	
									Radies	Rettich
Herbizid nach der Saat	●	●			<b>Trax</b>	1 l/ha		Speziell in Sommerkultur im Freiland. (GWS)		
Auflaufkrankheiten im Keimlingsstadium	●	●	●	●	<b>Bonita WG</b>	0,3 %		Überspritzen, nicht giessen.		
Falscher Mehltau			●		<b>Revus</b>	0,6 l/ha	7	Max. 2 Behandlungen. Im Stadium 12-49 (BBCH).		
Falscher Mehltau		●			<b>Revus</b>	0,6 l/ha	7	Max. 6 Behandlungen. Im Stadium 12-49 (BBCH).		
Weisser Rost			●		<b>Mildicut</b>	4 l/ha	14	Max. 4 Behandlungen. Ab Beginn des Dickenwachstums.		
Falscher Mehltau, Weisser Rost (Teilw.)	●				<b>Bion</b>	30-60 g/ha	7			
Blattläuse Erdflöhe, Erdräupen, Thripse, Minierfliegen, Blattläuse	●	●	●	●	<b>Techno 10 CS</b>	0,1 l/ha	14	Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen. Max. 2 Behandlungen mit diesem Wirkstoff. (GWS)		
Blattläuse	●	●	●	●	<b>Pirimor</b>	0,5 kg/ha	7	Maximal 2 Behandlungen. (GWS)		
Schnecken	●	●	●	●	<b>Amilon 5</b>	5-7 kg/ha		Ab Keimblatt streuen.		
Blattläuse, Spinnmilben	●	●	●	●	<b>Vista</b>	2 %	7	Pflanzen allseitig gut benetzen.		
Blattsaugende Insekten	●	●	●	●	<b>Siltac plus</b>	0,1-0,15 %		Die Spritzbrühe muss schnell antrocknen.		
Maulwürfe, Wühl- oder Schermaus	●	●	●	●	<b>Campa</b> 1-5 Gaspatronen/Kolonie			Die Gänge sind gut abzudichten.		

## Rhabarber

					<b>Silwet L-77</b>	0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.				
					<b>Agil</b>	0,75-2,5 l/ha		2,5 l/ha gegen Einj. Rispengras. Nach der Ernte.		
					<b>Bogard</b>	0,5 l/ha	14			
					<b>Ridomil Gold</b>	0,5 kg/ha		Maximal 3 Behandlungen: Bis spätestens Ende August. Nach der Ernte.		
					<b>Virexa</b>	2,5 kg/ha		Maximal 3 Behandlungen: Bis spätestens Ende August. Nach der Ernte.		
					<b>Techno 10 CS</b>	0,1 l/ha	14	Behandlung im Abstand von 7-14 Tagen, Maximal 2 Behandlungen mit diesem Wirkstoff. (GWS)		
					<b>Techno 10 CS</b>	0,1 l/ha		Behandlung im Abstand von 7-14 Tagen, Maximal 2 Behandlungen mit diesem Wirkstoff. Anwendung: Nach der Ernte (GWS).		
					<b>Pirimor</b>	0,5 kg/ha	7	Nur nach der Ernte. Max. 2 Behandlungen mit diesem Wirkstoff. (GWS)		



Getreide  
Mais  
Herbizid-Wirkungstabelle  
Kartoffeln  
Rüben Raps  
Soja / Erbsen / Sonnenblumen  
Feldbau div.  
Fütterkonservierung  
Weinbau  
Kernobst/Steinobst  
Gemüse / Beeren  
Zierpflanzenbau  
Nützlinge