Gemüsebau

Leu+Gygax AG

8. Kopfsalat, Zichorien, Endivien, Lattich, übrige Salate

WF = Wartefrist in Tagen

	Kopfsalat	Krach-, Eisbergsalat, Batavia	Lattich, Kraussalat	Lollo, Schnittsalat,	Eichblatt, Lactuca Spezialitäten	Endivien	Zuckerhut	Kopfzichorien	Chicorée (zur Wurzelproduktion)	Nüsslisalat	Ruccola			WF	
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.			
Nach der Saat oder Pflanzung									●			**Frontex**	1,3 l/ha		Splitbehandlung: 1. Behandlung: 2-Blattstadium (BBCH 12) 0,3 l/ha. 2. Behandlung: 4-Blattstadium (BBCH 14) 0,5 l/ha. 3. Behandlung: 6-Blattstadium (BBCH 16) 0,5 l/ha.
Ungräser, Ausfallgetreide,									●			**Agil**	1 l/ha	56	
Herbizid vor dem Auflaufen der Kultur										●		**Reglone**	3 l/ha		
Vorauflauf										●		**Soleto**	0,5-0,75 l/ha		nur gesäte Kulturen.
Herbizid nach der Pflanzung									●			**Bolero**	1 l//ha		Nachauflauf, ab 2-Blatt-Stadium bis zum 4-Blatt-Stadium der Kultur
Nach der Saat oder Pflanzung	●	●	●	●	●	●	●	●	●			**Granat**	2,5-3,75 l/ha		
ab 3-Blatt Stadium der Kultur											●	**Trax**	0,5 l/ha		
Erdflöhe											●	**Techno 10 CS**	0,1 l/ha	14	
Blattläuse	●	●	●	●	●	●	●	●				**Oikos**	1,5 l/ha	7	**Systemisches** Insektizid, früh behandeln.
Blattläuse, Salatwurzellaus	●	●	●	●	●	●	●	●			●	**Pirimor**	0,5 kg/ha	7	
	●	●	●	●	●	●	●	●				**Pirimor**	0,1 %		5 l/m² Setzlingsbehandlung. Vor dem Pflanzen angiessen.
Eulenraupen	●	●	●	●	●	●	●	●				**XenTari**	0,1 % 1 kg/ha	3 7	im Gewächshaus. im Freiland.
Eulenraupen									●			**Pyrinex**	3 l/ha	14	
Blattläuse (Röhrenläuse), Erdraupen, Minierfliegen Thripse	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	**Techno 10 CS**	0,2 l/ha	7	Behandlung im abstand von 7-14 Tagen. Maximal 2 Behandlungen mit diesem Wirkstoff.
Nutzinsekten (Treibhaus)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●●		Siehe Einsatzplan **Seite 103** oder fragen Sie den örtlichen LG-Berater			
Falscher Mehltau	●	●	●	●								**Bonita WG**	1,6 kg/ha		Setzlingsanzucht 100 g/100 l Wasser.
Falscher Mehltau	●	●	●									**Thiram 80**	1,5-2,5 kg/ha		Bis spätestens bis 14 Tage nach der Pflanzung.
Falscher Mehltau	●	●	●	●	●	●	●	● ●				**Booster**	3-3,5 l/ha	14 15	Spätestens bis 14 Tage nach der Pflanzung.
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	**Virexa**	2,5 kg/ha	21	Maximal 3 Behandlungn pro Jahr.
Falscher Mehltau	●	●	●									**Bion**	60 g/ha	7	
Alternaria, Falscher Mehltau, Rostpilze	●	●	●	●	●	●	●	●			●	**Ridomil Gold**	2 kg/ha	21	1. Behandlung bei Befall, maximal 3 Behandlungen.
Botrytis, Rhizoctonia solani										●	●	**Switch**	0,6 kg/ha	35	Behandlung bis spätestens 14 Tage nach der Pflanzung.
Marsonina Blattfleckenkrankheit	●	●				●	●					**Bogard**	0,5 l/ha	21	Maximal 4 Behandlungen pro Jahr.
Alternaria, Mehltau, Rost									●			**Bogard**	0,5 l/ha	21	Maximal 4 Behandlungen pro Jahr.
Botrytis, Rhizoctonia solani, Sclerotinia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	**Switch**	0,5-0,8 kg//ha		Behandlung bis spätestens 14 Tge nach der Pflanzung.
Botrytis	●	●	●	●	●	●	●	●	●			**Papyrus**	2 l/ha		Spätestens bis 14 tage nach Pflanzung. Maximal 1 Behandlung pro Jahr.
Echter Mehltau										●		**Bogard**	0,5 l//ha		Vor- oder unmttelbar nach der Pflanzung spätestestens im 4-Blatt-Stadium. Nur auf trockene Pflanzen.
Allgemeiner Aufbau	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	**Fetrilon Combi**	0,5 kg/ha		Mit Spritzbrühe ausbringen, **nicht in geschützten Kulturen!**
Wachstumsförderung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	**Folifert Super**	0,2 %/2 kg/ha		Pflanzenverträglicher Blattdünger.
Calciummangel (Innenblattdürre)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	**Basfoliar-Combi STIPP**	3 l/ha		Spez. Chicorino, Endivien, Kopfsalat, Zuckerhut, Salate (Asteracea).
Vitalität und klimabedingte Stressbewältigung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	**Polygrün**	1 l/ha		2-3 Behandlungen.
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	**Vital**	1 l/ha		2-3 Behandlungen.
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	**Penergetic p Gemüse**	0,1 kg/ha		2-3 Behandlungen.