





12. Rettich, Radies, Mairüben, Herbstrüben

	Radies	Rettich	Mairüben	Herbstrüben	WF = Wartezeit in Tagen		
							
	●	●	●	●	Silwet L-77	0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.	
Auflaufkrankheiten im Keimlingsstadium	●	●	●	●	Bonita WG	0,3 %	Überspritzen, nicht giessen.
Herbizid nach der Saat Ungräser, Einj. Rispengras	●	●	●	●	Trax	1 l/ha	Speziell in Sommerkultur im Freiland. Nur 1 Anwendung pro Jahr.
					Aramo	2 l/ha	
Falscher Mehltau		●	●	●	Forum	1,3 l/ha	21/14* * = Speiserüben. Ab Befallsbeginn, max. 2 Behandlungen.
Falscher Mehltau, Weisser Rost (Teilw.)	●				Bion	30–60 g/ha	7
Erdflöhe, Erdraupen	●	●	●	●	Techno	0,2 l/ha	14
Eulenraupen	●	●	●	●	Pyrinex	3 l/ha	21
Schnecken	●	●	●	●	Amilon 5	5-7 kg/ha	Ab Keimblatt streuen.

13. Rhabarber

		Silwet L-77		0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.	
	Herbizid	Stomp Aqua	2,2–3,5 l/ha		Einsatz während der Winterruhe vor Austrieb der Pflanze.
	Einj. Rispengras, Quecke	Agil	0,75–2,5 l/ha		2,5 l gegen Einj. Rispengras. Nach der Ernte.
	Blattflecken	Bogard	0,5 l/ha	14	
	Blattläuse Blattfressende Raupen	Pirimor	0,5 kg/ha	7	
	Erdraupen, Erdflöhe,	Techno	0,2 l/ha	14	
	Eulenraupen	Pyrinex	3 l/ha		Nach der Ernte.

14. Schnittlauch

	Ungräser, Einj. Rispengras	Aramo	1 l/ha	42	Nur 1 Anwendung pro Jahr.
	Samtfleckenkrankheit, (Cladosporium)	Bogard	0,5 l/ha	14	Maximal 4 Behandlungen pro Jahr. Behandlung bis 1 Woche nach dem Schnitt.
	Erdflöhe, Erdraupen, Thripse	Techno	0,2 l/ha	14	Codacide resp. bei reduzierten Wassermengen Silwet L-77 beimischen.