




Soja		Vorauflauf	Keimblatt – 2 Blatt 10-12	3–4 Blatt 13-14	Bildung Blütenknospen	
Unkrautbekämpfung		Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.				
Gegen einjährige Unkräuter und Ungräser inkl. Hirsen		Frontier X2 1,2 l/ha				Anwendung Vorauflauf bis 3 Tage nach der Saat. Nicht in Sandböden einsetzen.
Vorauflauf und Nachauflauf Unkräuter und Ungräser (speziell Amaranth und Nachtschatten)		Bolero 1 l/ha	Bolero 1 l/ha + Effican 1,5 l/ha			Splitbehandlung 2 x 0,5 l/ha Bolero 1 l/ha oder Effican 1,5 l/ha. Effican darf nicht in der Grundwasserschutzzone S2 eingesetzt werden.
Gegen einjährige Unkräuter (speziell Klebern und Knöterich, Zyperngras), Erdmandelgras			Effican 2 l/ha			Ergänzung zur Vorauflaufbehandlung. Unkräuter im Keim- bis 4-Blatt-Stadium. Effican darf nicht in der Grundwasserschutzzone S2 eingesetzt werden.
Ungräser, Hirsen, Raygras, Ausfallgetreide, Quecke			Agil 0,75–2,5 l/ha			Anwendung ab 1. echtem Blatt bis vor Bildung der ersten Blütenknospen. Quecke 2–2,5 l/ha.
Ungräser, Einjähriges Rispengras			Aramo 1–2 l/ha			Bester Behandlungszeitpunkt 3-Blattstadium bis Bestockung der Gräser.
Schädlinge			Amilon 5 5 - 7 kg/ha NEU			Kontrolle beim Auflaufen der Kultur.
Schnecken			Techno 0,15 l/ha			
Erdräupen						

Sonnenblumen		Vorauflauf	Keimblatt – 2 Blatt 10-12	3–4 Blatt 13-14	5–6 Blatt 15-16	
Herbizidstrategie		Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.				
Gegen einjährige Unkräuter und Ungräser inkl. Hirse und Knöterich		Racer CS 2 l/ha + Stomp Aqua 2 l/ha				
Unkrautbekämpfung						
Gegen einjährige Unkräuter und Ungräser inkl. Hirse, Hundspetersilie, Kamille und Klebern		Racer CS 2 l/ha + Frontier X2 1,2 l/ha				Anwendung Vorauflauf bis 3 Tage nach der Saat; Nicht in Sandböden einsetzen.
Blattdüngung						
Bor-Mangel				Micro Bor 3 l/ha		Im 4- bis 6-Blattstadium.
Schädlinge						
Schnecken			Amilon 5 5 - 7 kg/ha NEU			Kontrolle beim Auflaufen der Kultur.
Erdräupen			Techno 0,15 l/ha			Wartezeit: 6 Wochen

Konserven- und Eiweisserbsen		Vorauflauf	Keimblatt – 2 Blatt 10-12	3–4 Blatt 13-14	Bildung Blütenknospen 51-59	Hülsenbildung 71-79	
Unkrautbekämpfung		Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.					
Gegen einjährige Unkräuter (speziell Klebern und Knöterich)			Effican 1,5 - 2 l/ha + Stomp Aqua 0,9 l/ha				Splitbehandlung möglich. Effican darf nicht in der Grundwasserschutzzone S2 eingesetzt werden.
Vorauflauf und Nachauflauf Unkräuter und Ungräser (speziell Amaranth und Nachtschatten)		Bolero 1 l/ha	Bolero 1 l/ha + Effican 1 l/ha				Im Nachauflauf mischbar mit Effican. In Konservenerbsen 0,8 l/ha Bolero einsetzen.
Einjährige Unkräuter, Blacken, Disteln, Melden .			MCPB-flüssig 4 l/ha				Anwendung vor Bildung der 1. Blütenknospen. Mischbar mit Effican.
Ungräser, Hirsen, Raygras, Ausfallgetreide, Quecke			Agil 0,75–2,5 l/ha				Anwendung ab 1. echtem Blatt bis vor Bildung der ersten Blütenknospen. Quecke 1,75–2,5 l/ha.
Ungräser, Einjähriges Rispengras , Quecke			Aramo 1–2 l/ha				Bester Behandlungszeitpunkt 3-Blattstadium bis Bestockung der Gräser.
Schädlinge							
Schnecken			Amilon 5 5-7 kg/ha NEU				Kontrolle beim Auflaufen der Kulturen.
Erbsenwickler, Erdräupen			Techno 0,15 l/ha				Nur Eiweisserbsen. 1 Behandlung pro Kultur und Jahr.
Blattläuse					Pirimor 0,15 kg/ha		Wartezeit 2 Wochen. Schont Nützlinge. Bei Auftreten ab Beginn Blüte bis Beginn Hülsenbildung.
Blattdüngung							
					Fetrilon Combi 1 kg/ha		Fördert den Hülsenansatz.
Starter und Booster							
Für starke Wurzelbildung in Erbsen und Soja				Level 2 0,8 l/ha			Mischbar mit Herbiziden.

 = ÖLN: Beachten Sie den ökologischen Leistungsnachweis der für Ihr Gebiet zuständigen Kommission.