

WF = Wartezeit in Tagen

## Spargeln

Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.



|   |                     |               |    |  |
|---|---------------------|---------------|----|--|
| Herbizid in Junganlagen   | <b>Condoral SC</b>  | 0,75 l/ha     |    | Vor und nach der Ernte. (GWS)                                |
| Breitblättrige Unkräuter  | <b>Lentagran</b>    | 2 kg/ha       |    | Nach der Stechperiode.                                       |
| Ungräser, Ausfallgetreide, Quecke   | <b>Agil</b>         | 0,75-2,5 l/ha |    | 2,5 l/ha. Nach der Stechperiode.                             |
| Blattschwärze   | <b>Bonita WG</b>    | 0,3 %         |    | Nach der Ernte Laub sehr gut benetzen.                       |
| Graufäule   | <b>Switch</b>       | 0,1 kg/ha     |    | Nach der Ernte.  |
| Blattschwärze, Rostpilze  | <b>Bogard</b>       | 0,5 l/ha      |    | Im Sommer. Max. 4 Behandlungen pro Jahr. (GWS)               |
| Blattläuse (Röhrenläuse), Spargelkäfer, Erdraupen, Minierfliegen, Thripse | <b>Techno 10 CS</b> | 0,1 l/ha      | 14 | Nach der Ernte. Maximal 2 Behandlungen mit diesem Wirkstoff. |
| Schnecken   | <b>Amilon 5</b>     | 5-7 kg/ha     |    | Ab Beginn Durchstossen streuen.                              |
| Blattläuse  | <b>Pirimor</b>      | 0,5 kg/ha     |    | Nur nach der Ernte. Max. 2 Behandlungen.                     |

## Spinat



|   |                              |                     |          |  |
|---|------------------------------|---------------------|----------|--|
| Herbizid vor dem Auflaufen  | <b>Goltix 700 SC + Spark</b> | 1 l/ha<br>0,8 kg/ha |          | Frühjahr- und Sommerspinat. (GWS)  |
| Einjährige Unkräuter und Ungräser                                     | <b>Spark</b>                 | 1,5-2 kg/ha         |          | In sehr humosen Böden höhere Dosierung. (GWS)  |
| Nachauflauf   | <b>Betam</b>                 | 2x1 l/ha Split      | 21       | Im Keimblattstadium der Unkräuter. Nicht bei extremer Witterung behandeln.                 |
| Ungräser, Ausfallgetreide, Quecke                                     | <b>Agil</b>                  | 0,75-2,5 l/ha       | 21       |  |
| Falscher Mehltau<br>Papierfleckenkrankheit                            | <b>Bion</b>                  | 30 g/ha             | 7        |  |
| Falscher Mehltau<br>Papierfleckenkrankheit                            | <b>Ridomil Gold</b>          | 2,5 kg/ha           | 14<br>21 | Sommerspinat.<br>Winterspinat.   |
| Falscher Mehltau  | <b>Revus</b>                 | 0,6 l/ha            | 7<br>7   | (Freiland) 2 Behandlungen.<br>(Gewächshaus) 1 Behandlung.                                  |
| Blattläuse  | <b>Pirimor</b>               | 0,5 kg/ha           | 14       | Max. 2 Behandlungen mit diesem Wirkstoff. (GWS)  |
| Blattläuse (Röhrenläuse), Erdflöhe, Erdraupen, Minierfliegen, Thripse | <b>Techno 10 CS</b>          | 0,1 l/ha            | 7        | Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen. Maximal 2 Behandlungen mit diesem Wirkstoff. (GWS) |
| Blattvergilbung   | <b>Fetrilon-Combi 1</b>      | 1 kg/ha             |          | Ab 4-6-Blatt-Stadium. Speziell später Frühlings- und Herbstspinat.                         |
| Wachstumsförderung  | <b>Flüssigdünger LG</b>      | 5 l/ha              |          | Pflanzenverträglicher Blattdünger.   |