



| <b>Ackerbohnen</b>   |  | Vorauflauf   | Keimblatt –<br>2 Blatt<br>10-12 | 3–4 Blatt<br>13-14  | Bildung<br>Blütenknospen<br>50-59  | Hülsenbildung<br>70-79 |                               |
|--|--|--|---------------------------------|---|--|------------------------|--|
| <b>Unkrautbekämpfung</b>   |  | <b>Silwet L-77</b> 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung. |                                 |   |  |                        |  |
| Gegen einjährige Unkräuter und Ungräser inkl. Hirsen                                       |  | <b>Frontier X2</b><br>1,2–1,4 l/ha   |                                 |   |  |                        | Anwendung Vorauflauf bis 3 Tage nach der Saat; in leichten Böden untere Dosierung. Nicht in Sandböden einsetzen. |
| Vorauflauf und Nachauflauf<br>Unkräuter und Ungräser (speziell Amaranth und Nachtschatten) |  | <b>Bolero</b> 1 l/ha   |                                 |   |  |                        | Im Vorauflauf mischbar mit Frontier X2.  |
| Ungräser, Hirsen, Raygras, Ausfallgetreide, Quecke   |  | <b>Agil</b> 0,75–2,5 l/ha  |                                 |   |  |                        | Anwendung ab 1. echtem Blatt bis vor Bildung der ersten Blütenknospen. Quecke 2–2,5 l/ha.                        |
| Ungräser, <b>Einjähriges Rispengras</b> , Quecke   |  | <b>Aramo</b> 1–2 l/ha  |                                 |   |  |                        |  |
| <b>Schädlinge</b>  |  |  |                                 |   |  |                        |  |
| Erdräupen  |  | <b>Techno</b> 0,15 l/ha  |                                 |   |  |                        |  |
| Schnecken  |  | <b>Amilon 5</b> 5-7 kg/ha <b>NEU</b>   |                                 |   |  |                        | Kontrolle beim Auflaufen der Kultur.   |
| Blattläuse   |  |  |                                 |   | <b>Pirimor</b> 0,15 kg/ha  |                        | Bei Auftreten, schont Nützlinge.   |
| <b>Starter und Booster</b>   |  |  |                                 |   |  |                        |  |
| Für starke Wurzelbildung   |  |  |                                 | <b>Level 2</b><br>0,8 l/ha  |  |                        |  |
| <b>Tabak</b>   |  | Pflanzung  | 2–5 Blatt<br>12-15              | Ab 6 Blatt<br>16  |  |                        |  |
| <b>Unkrautbekämpfung</b>   |  | <b>Silwet L-77</b> 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung. |                                 |   |  |                        |  |
| Breitblättrige Unkräuter   |  | <b>Lentagran</b> 1 kg/ha   |                                 |   |  |                        | 2-4 Wochen nach der Pflanzung.   |
| <b>Krankheiten</b>   |  |  |                                 |   |  |                        |  |
| Falscher Mehltau, (Blauschimmel des Tabaks)  |  |  |                                 | <b>Forum</b> 1,5 l/ha + <b>Bonita WG</b> 2,5 kg/ha<br><b>Ranman Top</b> 0,5 l/ha<br><b>Ridomil Gold</b> 2,5 kg/ha |  |                        | Maximal 3 Behandlungen pro Jahr.<br>Maximal 3 Behandlungen pro Jahr.   |
| <b>Schädlinge</b>  |  |  |                                 |   |  |                        |  |
| Schnecken  |  | <b>Amilon 5</b> 5-7 kg/ha <b>NEU</b>   |                                 |   |  |                        | Behandlungen wiederholen.  |
| Eulendraupen   |  | <b>XenTari</b> 1 kg/ha   |                                 |   |  |                        |  |
| Erdräupen  |  | <b>Techno</b> 0.15 %   |                                 |   |  |                        |  |