






## 17. Tomaten in geschützten Kulturen

**Silwet L-77** 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.

**WF = Wartezeit in Tagen**



Herbizid Freiland	<b>Condoral SC</b>	0,5 l/ha		7-10 Tage nach der Pflanzung.
Einjährige Ungräser und Quecken	<b>Agil</b>	1,5-2,5 l/ha	56	2-3 Blattstadium der Ungräser.
Blattläuse div. Arten	<b>Pirimor</b>	0,05 %	7	Nützlingsschonend.
Blattläuse, Weisse Fliegen	<b>Oikos</b> 	1,5 l/ha	3	Systemisches Insektizid zur <b>vorbeugenden Behandlung</b> , 2-3 x, im Abstand von 7-10 Tagen.
Eulenraupen	<b>XenTari</b> 	0,1 %	3	
Tomatenminiermotte	<b>Rapid</b> <b>NEU</b>	0,15 % 1,5 kg/ha	3	Maximal 2 Behandlungen pro Jahr.
Spinnmilben (Eier, Larven, Adulte)	<b>Acramite</b>	0,25 l/ha	3	
Eulenraupen	<b>Credo</b>	0,04 %		nur Gewächshaus
Blattläuse (Röhrenläuse), Erdraupen, Minierfliegen, Thripse	<b>Techno 10 CS</b> <b>NEU</b>	0,01% 0,1 l/ha		Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen. Maximal 2 Behandlungen mit diesem Wirkstoff.
<b>Einsatz von Nutzinsekten siehe Einsatzplan Seite 94 oder fragen Sie den örtlichen LG-Berater.</b>				
Falscher Mehltau, Septoria	<b>Ridomil Gold</b>	2,5 kg/ha	21	Maximal 3 Behandlungen.
Bakterien- und Blattkrankheiten	<b>Flowbrix</b> 	4,5-7 l/ha	3	Hochwertiges Kupferpräparat.
Echter Mehltau	<b>Celos</b> 	0,1-0,2 %	3	Temperatur beachten.
Alternaria (Kraut- und Fruchtfäule), Septoria-Blattflecken	<b>Kupfer Bordo LG</b>  <b>Bouillie Bordelaise</b>	0,7 %	3	
Alternaria, Echter Mehltau, Falscher Mehltau (Krautfruchtfäule) Septoria-Blattflecken	<b>Bogard + Ranman Top</b>	0,5 l/ha 0,5 l/ha	3	Maximal 3 Behandlungen pro Jahr.
Botrytis, Sclerotinia	<b>Papyrus</b>	0,125 %	3	Maximal 1 Behandlung pro Jahr.
Botrytis, Sclerotinia	<b>Switch</b>	0,5-0,8 kg/ha	3	Maximal 2 Behandlungen pro Jahr.
Calciummangel, Blütenendfäule	<b>Basfoliar Combi</b> <b>STIPP</b>	0,2-0,3 % (2-3 l/ha)	21	3-5 Spritzungen notwendig oder 0,1 % giessen 5 l/m <sup>2</sup> 2mal innert 1 Woche, anschliessend nach Bedarf.
Eisenmangel	<b>Ferplus Top</b>	0,3-0,7 kg/ha		Vor dem Pflanzen einfräsen. Tomaten haben einen sehr hohen Eisenbedarf.
Mn-Mangel	<b>MaxMan 400</b>	1 l/ha		Bei jeder Spritzung beimischen.
	<b>Folifert Super</b>	0,2-0,3 %		Bei jeder Spritzung beimischen.