

	Produkt	Anwendung	Hinweise
Brachen und Stoppelfelder			
Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.			
Herbizide: Brache, Feldsaaten, Mulchsaaten	Glifonex TF	2-3 l/ha 4-6 l/ha 4-10 l/ha	Einjährige Unkräuter und Ungräser. Mehrjährige Gräser. Mehrjährige Unkräuter, bei Winden 10 l/ha verwenden.
Brache, Feldsaaten, Mulchsaaten	Roundup Turbo/Profi	1,5-2,5 l/ha,- 3-5 l/ha 3-7,5 l/ha	Einjährige Unkräuter und Ungräser. Mehrjährige Gräser. Mehrjährige Unkräuter, bei Winden 7,5 l/ha verwenden.
bei Winden, Blacken, Disteln	+ Dialen	0,5 l/ha	In Tankmischung mit 5 l/ha Glifonex oder 4 l/ha Roundup Profi/Turbo. Letzte Anwendung Ende September.
Lein (Flachs)			
Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.			
Herbizide: Unkräuter und Gräser	Speleo	25 g/ha	Nachauflauf ab 5 cm der Kultur.
Unkräuter	Effican	2 l/ha	Nachauflauf: im 2-4 Blattstadium der Unkräuter ab 5 cm der Kultur. Effican darf nicht in der Grundwasserschutzzone S2 werden.
Starterdünger	Level 2	0,8 l/ha	5 cm Kulturhöhe. Mischbar mit Herbiziden.
Erdraupen	Techno 10 CS	0,075 l/ha NEU	
Wiesen und Weiden			
Herbizide: a) Neusaaten	MCPB LG + Effican	2 l/ha 2 l/ha	In Neusaaten vor dem 1. Schnitt. Der Klee muss 2 echte Blätter aufweisen. Wartefrist: 3 Wochen, Galttiere 2 Wochen.
Mit jungen Blackensämlingen	MCPB LG + Asulam LG	4 l/ha 1 l/ha	Ab 2-Blatt-Stadium des Klees. Keine Anwendung in Alexandriner oder Perserklee Wartefrist: 3 Wochen, Galttiere 2 Wochen.
Kleegrasmischungen	Lentagran	1-2 kg/ha	Im Herbst bis Mitte Oktober. Wartefrist: 3 Wochen, Galttiere 2 Wochen.
Luzerne	Effican	2 x 1 l/ha	Splitbehandlung. Effican darf nicht in der Grundwasserschutzzone S2 eingesetzt werden.
Starterdünger	Level 2	0,8 l/ha	Behandlung wenn Klee 4 echte Blätter hat. Mischbar mit Herbiziden.
b) Flächenbehandlung: Blacken	Asulam LG	4 l/ha	Anwendung Frühling und Herbst. Vor Bildung der Blütenstände.
	+ Flüssigdünger	4 l/ha	Wartefrist: 3 Wochen, Galttiere 2 Wochen.
Alpenblacken, Farne	Asulam LG	4 l/ha	Flüssigdünger fördert die Wirkung. Wartefrist: 3 Wochen, Galttiere 2 Wochen.
	+ Flüssigdünger	4 l/ha	
Blackensämlinge und andere breitblättrige Unkräuter	MCPB LG	4-6 l/ha	In Kleegras-Neusaaten und Einsaaten vor 1. Schnitt. Der Klee muss 2 echte Blätter entwickelt haben. Behandlung bei wüchsigem Wetter vor Erscheinen der Blütenstiele durchführen. Wartefrist: 3 Wochen, Galttiere 2 Wochen.
Disteln	Duplosan KV Combi	2,5-3,25 l/ha	
c) Einzelstockbehandlung Blacken, Bärenklau, Kerbel, Brennessel, St. Jakobskreuzkraut u.a.	Blackex	Mischverhältnis 1:2	Enthält roten Farbstoff zum besseren Erkennen behandelter Pflanzen. Anwendung mit Sprüh- und Spritzgeräten. Wartefrist: 3 Wochen, Galttiere 2 Wochen.
Giftige Kreuzkräuter, Weisses Germer	Zwei 4-D + Duplosan KV Combi	0,4-0,5 % 1-10 %	Einzelstockbehandlung.
Blacken	Asulam LG	1%	Wartefrist: 3 Wochen, Galttiere 2 Wochen.
Biodiversitätsförderflächen (BFF) gemäss DZV			
Herbizide:	Glifonex TF	5-10%	Ausbringung mit Handspritzgeräten ohne Rückenspritze.
	Roundup Turbo/Profi	5-7,5%	