

## Zierpflanzenbau

Kulturen	Wirkungsspektrum	Produkt	Anwendung	Hinweis	
<b>Fungizide</b>		<b>Silwet L-77</b> 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.			
Chrysantheme	Weisser Rost	<b>Bion</b>	0,005 % = 5 g/100 l	Vorbeugende Anwendung. Maximal 5 Behandlungen im Abstand von 10 Tagen. <b>Kulturverträglichkeit beachten.</b>	
Allg. Zierpflanzen	Blattfleckenpilze, Echte Mehltapilze, Roste, Sternrusstau	<b>Bogard</b>	0,05 %	Max. 3 Behandlungen pro Jahr.	
Allg. Zierpflanzen	Echter Mehltau	<b>Celos</b>	0,1-0,2 %	<b>Kulturverträglichkeit beachten.</b>	
Kirschlorbeer	Schrotschuss		0,1-0,2 %		
Allg. Zierpflanzen	Blackenfleckenpilze	<b>Cuproxat flüssig</b>	0,2-1 %	<b>Kulturverträglichkeit beachten.</b>	
Begonien, Pelargonien	Falsche Mehltapilze		0,2-0,6 %		
Bloutanne	Bakteriosen		0,2 %		
Rhododendron	Knospensterben		2,1 %		
Rosen	Knospensterben		0,2-0,6 %		
	Rindenbrandkrankheit		0,2 / 1,3 %		1,3 % = Herbst- und Winterspritzung.
Allg. Zierpflanzen	Blattfleckenpilze, Falscher Mehltau, Rostpilze		<b>Legan WG</b> <b>NEU</b>		0,05 %
Azaleen	Ohrläppchenkrankheit		0,05 %		
Rosen	Sternrusstau		0,05 %		
Allg. Zierpflanzen	Blackfleckenpilze	<b>Flowbrix</b>	0,2-1 %	<b>Kulturverträglichkeit beachten.</b>	
Allg. Zierpflanzen, Stauden, Ziergehölze	Falscher Mehltau	<b>Forum</b>	2-3 l/ha	Mischbar mit Mancozeb 2-3 kg/ha, max. 3 Behandlungen pro Kultur und Jahr. <b>Kulturverträglichkeit beachten.</b>	
Allg. Zierpflanzen	Echter Mehltau	<b>Nimrod</b>	0,1-0,2 %	<b>Kulturverträglichkeit beachten.</b>	
Allg. Zierpflanzen	Blattfleckenpilze, Falscher Mehltau, Rostpilze	<b>Ridomil Gold</b>	0,25 %	Max. 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr. <b>Kulturverträglichkeit beachten.</b>	
Allg. Zierpflanzen	Rhizoctonia-Stängelfäule	<b>Rizolex 50 SC</b>	1 ml/m <sup>2</sup> in 1 l Wasser	Giessbehandlung bei der Anzucht von Jungpflanzen.	
Allg. Zierpflanzen	Rost	<b>Cargo</b>	0,3 %	<b>Kulturverträglichkeit beachten.</b>	
Chrysantheme	Blackfleckenpilze		0,2 %		
Iris	Tintenkrankheit		0,2 %		
Nelke	Nelkenschwärze		0,2 %		
Zier- und Sportrasen	Krankheiten durch pathogene Bodenpilze		0,3 %		
Allg. Zierpflanzen	Botrytis	<b>Papyrus</b>	2 l/ha	Maximal 1 Behandlung pro Jahr.	
Chrysantheme, Nelke	Rostpilze	<b>Stroby</b>	0,03 %	<b>Kulturverträglichkeit beachten.</b>	
Rosen	Echter Mehltau, Sternrusstau		0,03 %		
Allg. Zierpflanzen	Graufäule	<b>Switch</b>	0,1-0,12 %	2 Behandlungen. <b>Kulturverträglichkeit beachten.</b>	
Buchsbäume	Cylindrocladium buxicola	<b>Switch</b>	0,1 %	Mitte April - Oktober. Max. 4 Behandlungen im Abstand von 4 Wochen.	
Zier- und Sportrasen	Schneeschnitz, Typhula Fäule	<b>Switch</b>	1,5 kg/ha	2 Behandlungen.	
<b>Diverse Produkte</b>					
Zierpflanzen allg.	Pflanzenstärkung	<b>Vital</b>	1 l/ha oder 3-5 ml/ l Wasser	Als Zusatz zu Fungizid- oder Insektizid-behandlungen.	
	Erhöhung des Netz- und Haftvermögens	<b>Codacide</b>	2 l/ha	Als Zusatz zu Fungizid- oder Insektizid-behandlungen.	
Allg. Zierpflanzen, Stauden, Ziergehölze	Eisenmangel	<b>Ferplus Top</b>	0,3-0,7 kg/a	Ausgangs Winter streuen und einarbeiten.	
Baumschulen, Containerpflanzen, Ziergehölze	Startdüngung mit Langzeitwirkung	<b>Fertilinz</b> (Düngetablette)	1-4 Tabl./Pfl.	Bei Neupflanzungen oder zum Start im Frühjahr.	
Allg. Zierpflanzen, Stauden, Ziergehölze, Zier- und Sportrasen	Blattdünger	<b>Flüssigdünger LG</b>	0,2-0,5 %	Als Zusatz zu Fungizid- oder Insektizid-behandlungen.	
Allg. Zierpflanzen, Stauden, Ziergehölze, Zier- und Sportrasen	Blattdünger	<b>Folifert Super</b>	0,2-0,5 %	Gut löslicher Blattdünger. Wirkt pH-senkend in der Spritzbrühe.	
Allg. Zierpflanzen, Stauden, Ziergehölze	Erhöhung des Netz- und Haftvermögens	<b>Netzmittel</b>	0,05-0,1 %	Als Zusatz zu Fungizid- oder Insektizid-behandlungen.	
Allg. Zierpflanzen, Stauden, Ziergehölze	Erhöhung des Netz- und Haftvermögens	<b>Silwet L-77</b>	1 dl/ha	In jede Spritzung bei reduzierten Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.	