

Kartoffeln



Abbrennen von Kartoffelstauden

Schnecken

Antischneck-Feinkorn oder **Epanex**

5 - 10 kg/ha

Vor und nach der Abbrennperiode

Abbrennen von **Saat**, Speise- und Futterkartoffeln mit Wirkung auf Sporen der Krautfäule. **Bei Bedarf vor Behandlung Stauden abschlegeln.**

Lotus + **Herbizid-Zusatzöl** + **Ranman**

0,75 l/ha

5 l/ha

0,2 l/ha

Nicht am Abend spritzen.
Für Sporenabtötung der Knollenfäule Ranman beimischen.
Ranman nicht mit Silwet L-77 mischen.

Abbrennen von **Saat**, Speise- und Futterkartoffeln mit Wirkung auf Sporen der Krautfäule. **Ohne Verletzung der Stauden.**

Reglone + **Ranman**

2-2,5 l/ha

0,2 l/ha

Nach 4 Tagen: **Lotus** + **Herbizid-Zusatzöl** + **Ranman**

0,75 l/ha

5 l/ha

0,2 l/ha

Nicht am Abend spritzen. Stauden nicht verletzen.
Für Sporenabtötung der Knollenfäule Ranman beimischen.
Ranman nicht mit Silwet L-77 mischen.
Reglone: Tiefere Dosierung bei **Saatkartoffeln**.

Abbrennen von Speise- und Futterkartoffeln mit Wirkung auf Sporen der Krautfäule. **Ohne Verletzung der Stauden.**

Reglone + **Ranman**

4,5-4,8 l/ha

0,2 l/ha

Nicht am Abend spritzen. Bei sehr trockener Witterung können Knollenschäden auftreten. Stauden nicht verletzen.
Für Sporenabtötung der Knollenfäule Ranman beimischen.
Ranman nicht mit Silwet L-77 mischen.