

Soja	Vorauf	Keimblatt – 2 Blatt 10-12	3–4 Blatt 13-14	Bildung Blütenknospen	Leu+Gygax AG
	Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.				
Unkrautbekämpfung					
Gegen einjährige Unkräuter und Ungräser inkl. Hirsen	Frontier X2 1,2 l/ha + Bolero 0,8 l/ha				Anwendung Vorauf bis 3 Tage nach der Saat. Nicht in Sandböden einsetzen.
Vorauf und Nachauf Unkräuter und Ungräser (speziell Amarant und Nachtschatten)	Bolero 1 l/ha	Bolero 1 l/ha + Basagran SG 0,55-1,1 kg/ha			Splitbehandlung 2 x 0,5 l/ha Bolero + 0,5 kg/ha Basagran SG möglich. Basagran darf nicht in der Grundwasserschutzzone S2 eingesetzt werden.
Gegen einjährige Unkräuter (speziell Klebern und Knöterich)		Basagran SG 1,1 kg/ha			Ergänzung zur Voraufbehandlung. Unkräuter im Keim- bis 4-Blatt-Stadium. Basagran darf nicht in der Grundwasserschutzzone S2 eingesetzt werden.
Ungräser, Hirsen, Raygras, Ausfallgetreide, Quecke		Focus Ultra 2–6 l/ha			Anwendung ab 1. echtem Blatt bis vor Bildung der ersten Blütenknospen. Quecke 5–6 l/ha.
Ungräser, Einjähriges Rispengras		Aramo 1–2 l/ha			Bester Behandlungszeitpunkt 3-Blattstadium bis Bestockung der Gräser.
Schädlinge					
Schnecken		Antischneck Feinkorn oder Epanex 5 - 10 kg/ha			Kontrolle beim Auflaufen der Kultur.

Sonnenblumen	Vorauf	Keimblatt – 2 Blatt 10-12	3–4 Blatt 13-14	5–6 Blatt 15-16	Leu+Gygax AG
	Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.				
Unkrautbekämpfung					
Gegen einjährige Unkräuter und Ungräser inkl. Hirsen	Frontier X2 1,2 l/ha + Linuron LG 0,6 kg/ha				Anwendung Vorauf bis 3 Tage nach der Saat; Nicht in Sandböden einsetzen.
Gegen einjährige Unkräuter und Ungräser inkl. Hirse, Kamille und Klebern	Racer CS 2 l/ha + Frontier X2 1,2 l/ha				
Gegen einjährige Unkräuter und Ungräser inkl. Hirse und Knöterich	Racer CS 2 l/ha + Stomp 400 SC 2 l/ha				
Ungräser, Hirsen, Raygras, Ausfallgetreide, Quecke		Focus Ultra 2–6 l/ha			Anwendung ab 1. echtem Blatt. Quecke 5–6 l/ha
Blattdüngung					
Bor-Mangel			Micro Bor 3 l/ha		Im 4- bis 6-Blattstadium.
Schädlinge					
Schnecken		Antischneck Feinkorn oder Epanex 5 - 10 kg/ha			Kontrolle beim Auflaufen der Kultur.

Konserven- und Eiweisserbsen	Vorauf	Keimblatt – 2 Blatt 10-12	3–4 Blatt 13-14	Bildung Blütenknospen 51-59	Hülsenbildung 71-79	Leu+Gygax AG
	Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.					
Unkrautbekämpfung						
Gegen einjährige Unkräuter (speziell Klebern und Knöterich)		Basagran SG 0,55-1,1 kg/ha + Stomp 400 SC 1 l/ha				Splitbehandlung möglich. Basagran darf nicht in der Grundwasserschutzzone S2 eingesetzt werden.
Vorauf und Nachauf Unkräuter und Ungräser (speziell Amarant und Nachtschatten)	Bolero 1 l/ha	Bolero 1 l/ha + Basagran SG 0,5 kg/ha				Im Nachauf mischbar mit Basagran SG. In Konservenerbsen 0,8 l/ha Bolero einsetzen.
Einjährige Unkräuter, Blacken, Disteln, Melden .		MCPB-flüssig 4 l/ha				Anwendung vor Bildung der 1. Blütenknospen.
Ungräser, Hirsen, Raygras, Ausfallgetreide, Quecke		Focus Ultra 2–6 l/ha				Anwendung ab 1. echtem Blatt bis vor Bildung der ersten Blütenknospen. Quecke 5–6 l/ha.
Ungräser, Einjähriges Rispengras		Aramo 1–2 l/ha				Bester Behandlungszeitpunkt 3-Blattstadium bis Bestockung der Gräser.
Schädlinge						
Schnecken		Antischneck Feinkorn oder Epanex 5 - 10 kg/ha				Kontrolle beim Auflaufen der Kulturen.
Erbsenblatrandkäfer		Fastac Perlen 70 g/ha				Nur Konservenerbsen.
Blattläuse				Pirimor 0,15 kg/ha		Wartezeit 2 Wochen. Schont Nützlinge. Bei Auftreten ab Beginn Blüte bis Beginn Hülsenbildung.
Blattdüngung						
				Fetrilon Combi 1 kg/ha		Fördert den Hülsenansatz.

 = ÖLN: Beachten Sie den ökologischen Leistungsnachweis der für Ihr Gebiet zuständigen Kommission.