Empfehlung Äpfel

Leu+Gygax AG



Knospenschwellen

Stadium B
51

Knospenaufbruch

Stadium C3
53

Grünknospen-stadium

Stadium D
56

Ballonstadium der Blüte

Stadium E
59

30 % der Blüten geöffnet

Stadium F
63

Abgehende Blüte

Stadium G
67

Alle Blütenblätter abgefallen

Stadium H
69



Fruchtgrösse 10 mm / Nachblütefruchtfall

Stadium I
71

Zweiter Fruchtfall

Stadium J
73

Beginn der Fruchtreife

Sommer

(Basis 1600 l/ha Wasser. bei 10 000 m³ Baumvolumen)

Feuerbrand: **Ag Streptomycin** 0,0375 % / 600 g/ha während der Blüte max. 2 Behandlungen bei Infektionsgefahr.

Krankheiten

Schorf

Flowbrix [10®] 0,125 – 0,25 %

Delan® WG [9] 0,05 % = 0,8 kg/ha

Delan® WG [9] 0,05 % = 0,8 kg/ha

Delan® WG [9] 0,05 % = 0,8 kg/ha

Bogard® [7] 0,015 % = 0,24 l/ha

Stroby® [5] 0,0125 % = 200 g/ha

Bogard® [7] 0,015 % = 0,24 l/ha

Stroby® [5] 0,0125 % = 200 g/ha

Captan® 80 WDG [1] 0,15 % = 2,4 kg/ha
oder Delan® WG [9] 0,05 % = 0,8 kg/ha

Folpet® 80 WDG [1] 0,1 % = 2 kg/ha
+ Netzmittel LG 0,8 l/ha
oder Captan® 80 WDG [1] 0,15 % = 3 kg/ha

Mehltau

Netz-schwefel [11] 0,4 % = 6,4 kg/ha

Netz-schwefel [11] 0,4 % = 6,4 kg/ha

Captan® 80 WDG [1] 0,1 % = 1,6 kg/ha

Captan® 80 WDG [1] 0,1 % = 1,6 kg/ha

Captan® 80 WDG [1] 0,1 % = 1,6 kg/ha

Captan® 80 WDG [1] 0,1 % = 1,6 kg/ha

Nimrod ® [9] 0,05 % = 0,8 l/ha

Nimrod ® [9] 0,05 % = 0,8 l/ha

Lagerkrankheiten

Hagelschlag: **Folpet 80 WDG** 0,125 = 2 kg/ha innerhalb von 18 Stunden spritzen.

Folpet® 80 WDG [1] 0,1 % = 2 kg/ha
+Netzmittel LG 0,8 l/ha
oder Silwet® L77 0,1 % = 0,1 l/ha

Schädlinge

Schädlingskontrolle — Visuell — über Fallen — Klopfprobe

Spinnmilben

Spinnmilben

Rostmilben

SprayOil [50] **7E** 2 % = 32 l/ha **oder Oleo-Diazinon R ®** [50] 0,5 % / 8 l/ha

Matacar [55] 0,05 % = 0,8 kg/ha

Falter und Schmetterlinge

Apfelwickler

RAK® 3 [31] (Ausbringung vor dem 1. Flug) 500 Dispenser / ha

Fruchtschalenwickler

Rimon® [37] 0,06 % = 0,96 l/ha

Rimon® [37] 0,06 % = 0,96 l/ha

Pyrinex® [42] 0,15 % = 2,4 l/ha

Kleiner Fruchtwickler

Frostspanner

Oleo-Diazinon R® [50] 0,5 % = 8 l/ha

Eulenraupen

Rimon® [37] 0,06 % = 0,96 l/ha

Minierfliegen

Rimon® [37] 0,06 % = 0,96 l/ha

Pflanzensauger

Mehlige Apfelblattlaus

Oïkos® [13] 0,1 % = 1,6 l/ha

Grüne Apfellaus

Blattläuse

Oleo-Diazinon R® [50] 0,5 % = 8 l/ha

Pirimor® [40] 0,04 % = 0,64 kg/ha

Pirimor® [40] 0,02 % = 0,32 kg/ha

Schildläuse

San José Schildlaus

SprayOil [50] **7E** 2 % = 32 l/ha **oder Oleo-Diazinon R ®** [50] 0,5 % / 8 l/ha

Pyrinex® [42] 0,15 % = 2,4 l/ha

Diverse Schädlinge

Apfelsägewespe

Pyrinex® [42] 0,15 % = 2,4 l/ha

Apfelblütenstecher

Pyrinex® [42] 0,15 % = 2,4 l/ha

Gallmücken

Diazinon [42] 0,1 % = 1,6 l/ha

Fruchtwanzen

Unkrautbekämpfung und Diverses

Roundup® Turbo 1,5 - 7,5 l/ha **oder Glifonex®** 3 - 10 l/ha **oder Oscar®** 8 - 10l/ha

Focus® Ultra 2-6 l/ha

Befruchtung	Bormangel	Chemische Ausdünnung	Bormangel	Stippigkeit	Spurenelemente
Tripol® 3-5 Einheiten pro ha	**Micro Bor** 0,1 % / 1,6 l/ha	**Phytonic®** 15-40 g in 200 l Wasser oder **Ethephon LG** 0,3 l/ha	**Micro Bor** 0,1 % / 1,6 l/ha	**Tip Calcium oder Basfoliar Combi** 5-10 l/ha: 4 - 8 mal	
				Fetrilon Combi 0,4 kg/ha Ab Nussgrösse bis Ende August jeder Spritzung beimischen.	

Generelle Hinweise:

Die offiziellen Warnmeldungen und Empfehlungen beachten (Pflanzenschutzempfehlungen für den Obstbau 2011).
Die angegebenen Aufwandmengen und die Behandlungszeitpunkte sind dem Krankheitsdruck und den klimatischen Bedingungen anzupassen.

Die hochgestellten Zahlen beziehen sich auf die Produktnummerierung der Pflanzenschutzempfehlungen für den Obstbau 2010.