





Aprikosen

Entwicklungsstadien/ Krankheiten/ BBCH		Produkt	Baumvolumen Konzept 10'000 m ³ Basis 1600 l/ha %		Hinweise
Schädlinge				kg/l / ha	
SIlwet L-77 🌿 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.					
B-C / 51-53					
Austrieb 	Schrotschuss + Bakteriosen	Flowbrix 🌿	0,25-0,4%	4-6,4 l/ha	Hochwertiges Kupferpräparat.
	Frostspanner	Oleo-Diazinon R 🌿	0,5 %	8 l/ha	
E / 57					
aufgehende Blüte 	Monilia + Schrotschuss	Bogard 🌿 + Captan 80 WDG 🌿	0,02 % 0,1 %	0,32 l/ha 1,6 kg/ha	Wartefrist: 3 Wochen. Maximal 4 Behandlungen.
Blüte	Befruchtung (Speziell unter Netzen)	Tripol 🌿			3-5 Einheiten pro ha (Beratung verlangen).
H / 69					
abgehende Blüte 	Monilia + Schrotschuss	Bogard 🌿 + Captan 80 WDG 🌿	0,02 % 0,1 %	0,32 l/ha 1,6 kg/ha	Wartefrist: 3 Wochen. Maximal 4 Behandlungen.
	Schrotschuss	Captan 80 WDG 🌿	0,15 %	2,4 kg/ha	
	Eulenraupen, Frostspanner	Diazinon flüssig LG 🌿	0,1 %	1,6 l/ha	Ende der Blüte behandeln.
	Blattläuse	Pirimor 🌿	0,04 %	0,64 kg/ha	
J / 73					
3 Wochen später 	Monilia, Mehltau	Bogard 🌿 + Captan 80 WDG 🌿	0,02 % 0,1 %	0,32 l/ha 1,6 kg/ha	Wartefrist: 3 Wochen. Maximal 4 Behandlungen.
	Schrotschuss	Captan 80 WDG 🌿	0,15 %	2,4-3 kg/ha	
	Spinnmilben	Matacar 🌿	0,05 %	0,8 kg	Nur 1 Behandlung pro Jahr mit einem Produkt der Gruppe Matacar, Trevi oder Apollo.
Ende Mai - Juni	Monilia, Mehltau	Bogard 🌿 + Captan 80 WDG 🌿	0,02 % 0,1 %	0,32 l/ha 1,6 kg/ha	Wartefrist: 3 Wochen. Maximal 4 Behandlungen.
	Schrotschuss	Captan 80 WDG 🌿	0,15 %	2,4 kg/ha	
	Aprikosenwickler	Pyrinex 🌿	0,15 %	2,4 l/ha	Gemäss den Anweisungen der offiziellen Beratung. Bei verlängertem Flug des Wicklers Behandlung unter Einhaltung der Wartefrist von 3 Wochen wiederholen. Mindestabstand von 100 m zu Oberflächengewässern.
Mitte Oktober	Schadsschwellenbeurteilung, Frostspanner	Raupenleimringe 🌿			Im Streuobst.