

WF = Wartezeit in Tagen

## 4. Karotten



**Silwet L-77** 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.

Herbizid vor dem Auflaufen	<b>Stomp 400 SC</b> + <b>Linuron LG</b>	3 l/ha 0,6–1,0 kg/ha		Unmittelbar nach der Saat.
Herbizid nach dem Auflaufen.	<b>Linuron LG</b>	1,5–2,5 kg/ha		Ab 3. echtem Blatt der Karotten.
Ungräser, Ausfallgetreide, Quecke	<b>Focus Ultra</b>	2–6 l/ha	28	5–6 l/ha gegen Quecke (ca. 20 cm hoch).
Ungräser, Einj. Rispengras	<b>Aramo</b>	2 l/ha	28	Nur eine Anwendung pro Jahr.
Möhrenfliege	<b>Diazinon Granulat</b>	80 kg/ha in Mineralböden 120 kg/ha in Moorböden	42	Warnmeldung der Forschungsanstalten beachten. Granulat leicht einarbeiten.
	<b>Fastac Perlen</b>	70 g/ha in 1000 l Wasser	28	Alle 8–10 Tage wiederholen während des Fluges.
Blattläuse	<b>Pirimor</b>	0,5 kg/ha	7	
Möhrenblattsauger (Möhrenblattfloh)	<b>Diazinon flüssig</b> <b>Fastac Perlen</b>	1 l/ha 70 g/ha	14 14	
Eulenraupen	<b>Pyrinex</b>	3 l/ha	14	
Alternaria/Möhrenschwärze	<b>Mancozeb 80 LG</b>	2–3 kg/ha	21	1. Behandlung bei Befallsbeginn, regelmäßige Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. Hochwertiges Kupferpräparat.
	<b>Rover Star</b>	4 l/ha	21	
	<b>Flowbrix</b> oder	4,5–7 l/ha	21	
	<b>Cuproxtat flüssig</b>	8–12 l/ha	21	
	<b>Bogard</b>	0,5 l/ha	14	Maximal 4 Behandlungen pro Jahr.
Wachstumsförderung	<b>Fetrilon Combi</b>	1 kg/ha		Als Zusatz zu Insektizid- oder Fungizidspritzungen.

## 5. Knollensellerie



Herbizid vor der Pflanzung	<b>Stomp 400 SC</b> + <b>Linuron LG</b>	3 l/ha 0,6–1 kg/ha		
Herbizid nach der Pflanzung	<b>Linuron LG</b>	2–3 kg/ha		Im 2–6-Blatt-Stadium der Unkräuter. (Kamillen vor dem Auflaufen).
Ungräser, Ausfallgetreide, Quecke	<b>Focus Ultra</b>	2–6 l/ha	56	5–6 l/ha gegen Quecke (ca. 20 cm hoch).
Ungräser, Einj. Rispengras	<b>Aramo</b>	2 l/ha	28	Nur 1 Anwendung pro Jahr.
Blattläuse	<b>Pirimor</b> <b>Diazinon flüssig</b>	0,5 kg/ha 1 l/ha	7 14	
Thrips, Raupen, Selleriewanzen	<b>Diazinon flüssig</b> <b>Fastac Perlen</b>	1 l/ha 70 g/ha	14 28	
Möhrenfliege	<b>Diazinon Granulat</b>	80 kg/ha in Mineralböden 120 kg/ha in Moorböden	42	Warnmeldungen der Forschungsanstalten beachten.
	<b>Fastac Perlen</b>	70 g/ha	28	Spritzungen alle 8–12 Tage während des Fluges.
Eulenraupen	<b>Pyrinex</b>	3 l/ha	14	
Septoria-Blattfleckenkrankheit	<b>Rover Star</b>	4 l/ha	21	1. Behandlung bei Befallsbeginn, regelmäßige Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. Hochwertiges Kupferpräparat. Maximal 4 Behandlungen pro Jahr.
	<b>Flowbrix</b>	4,5–7 l/ha	21	
	<b>Bogard</b>	0,5 l/ha	14	
Bormangel	<b>Micro Bor</b>	3 l/ha		Der Spritzbrühe begeben. Spez. bei Trocken-Perioden.
Calcium- und Spurenelementmangel	<b>Basfoliar Combi STIPP</b>	3 l/ha		Der Spritzbrühe begeben, besonders auch bei Suppensellerie.
Calcium-Versorgung spez. Lagersellerie	<b>Tip / Calcium</b>	5 l/ha		Spätsommer bis Herbst.