



7. Kopfsalat, Zichorien, Endivien, Lattich, übrige Salate

Kopfsalat Krach-, Eisbergsalat, Batavia Lattich Lollo, Schnittsalat, Eichblatt, Kraussalat Endivien Zuckerhut Kopfzichorien	WF = Wartefrist in Tagen	
	Herbizid- Wirkungstabelle	Wartefrist in Tagen
		
	● ● ● ● ● ● ●	Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.
Herbizid vor der Pflanzung	● ● ● ● ● ● ●	Stomp 400 SC 2,5-4 l/ha Nur möglich, wenn mit einer Scharpflanzmaschine gesetzt wird. Keine Anwendung unter Flachabdeckung im Frühjahr.
Erdräupen, Erdflöhe	● ● ● ● ● ● ●	Fastac Perlen 70 g/ha 14
Blattläuse	● ● ● ● ● ● ●	Oikos 1,5 l/ha 7 Systemisches Insektizid zur vorbeugenden Behandlung.
Blattläuse, Salatwurzellaus	● ● ● ● ● ● ●	Pirimor 0,5 kg/ha 7
	● ● ● ● ● ● ●	Pirimor 0,1 % 5 l/m ² Setzlingsbehandlung. Vor dem Pflanzen angiesen.
Blattläuse, Erdflöhe	● ● ● ● ● ● ●	Diazinon flüssig 1 l/ha 14
Blattläuse, Eulendraupen, Thripse	● ● ● ● ● ● ●	Lannate 25 WP NEU 1,5 kg/ha 14
Salatwurzellaus	● ● ● ● ● ● ●	Diazinon Granulat 4 g/lfm / 10 g/m ² Vor dem Pflanzen einarbeiten. Nur Juni bis August Befallsgefahr.
Eulendraupen	● ● ● ● ● ● ●	Pyrinex 3 l/ha 14
Falscher Mehltau	● ● ● ● ● ● ●	Mancozeb 80 LG 0,2 % / 16g/a Setzlingsanzucht 100 g/100 l Wasser.
Falscher Mehltau	● ● ● ● ● ● ●	Forum + Thiram 80 1 l/ha 2,5 kg/ha Spätestens bis 14 Tage nach der Pflanzung.
Alternaria, Falscher Mehltau, Rostpilze	● ● ● ● ● ● ●	Ridomil Gold 2 kg/ha 21 1. Behandlung bei Befall, maximal 3 Behandlungen.
Marsonina Blattfleckenkrankheit	● ● ● ● ● ● ●	Bogard 0,5 l/ha 28 Maximal 4 Behandlungen pro Jahr.
Allgemeiner Aufbau	● ● ● ● ● ● ●	Fetrilon Combi 0,5 kg/ha Mit Spritzbrühe ausbringen, nicht in geschützten Kulturen!
Wachstumsförderung	● ● ● ● ● ● ●	Folifert Super 0,2 % / 2 kg/ha Pflanzenverträglicher Blattdünger.
Calciummangel (Innenblattdürre)	● ● ● ● ● ● ●	Basfoliar-Combi STIPP 3 l/ha Spez. Chicorino, Endivien, Kopfsalat, Zuckerhut.