




11. Rettich, Radies, Mairüben, Herbstrüben

	Radies	Rettich	Mairüben	Herbstrüben			WF = Wartefrist in Tagen
							
	●	●	●	●	Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.		
Auflaufkrankheiten im Keimlingsstadium	●	●	●	●	Mancozeb 80 LG 0,3 %		Überspritzen, nicht giessen.
Herbizid nach der Saat	●	●			Ramrod 7 l/ha Radies 8-9,5 l/ha Rettich		Sofort bis 3 Tage nach der Saat auf feuchten, abgesetzten Boden spritzen.
	●	●			Butisan S 1 l/ha		Speziell in Sommerkultur im Freiland.
Falscher Mehltau		●	●	●	Forum 1,3 l/ha	21/ 14*	* = Speiserüben. Ab Befallsbeginn, max. 2 Behandlungen.
Erdflöhe, Springschwänze	●	●	●	●	Fastac Perlen 70 g/ha	14	Sobald kleine Löcher in den Keimblättern sichtbar werden.
Blattläuse, Kohleule, Kohlmottenschildlaus, Kohlschabe, Thripse, Weisslinge			●	●	Lannate 25 WP NEU 1,5 kg/ha	14	Systemisch.
		●			Birlane flüssig 0,2 %/2,5 dl/lfm	21	Reihenbehandlung nach dem Auflaufen.
Eulenraupen	●	●	●	●	Pyrinex 3 l/ha	21	
Schnecken	●	●	●	●	Antischneck Feinkorn oder Epanex 5-10 kg/ha		Ab Keimblatt streuen.

12. Rhabarber

					WF = Wartefrist in Tagen
					Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.
	Herbizid	Stomp 400 SC	2,5-4 l/ha		Einsatz während der Winterruhe vor Austrieb der Pflanze.
	Ungräser, Ausfallgetreide, Quecke	Focus Ultra	2-6 l/ha		5-6 l/ha gegen Quecke (ca. 20 cm hoch). Behandlungen nach der Ernte.
	Blattläuse	Pirimor	0,5 kg/ha	7	Systemisch.
	Blattfressende Raupen	Lannate 25 WP NEU	1,5 kg/ha	14	
	Erdraupen, Erdflöhe,	Fastac Perlen	70 g/ha	14	
Eulenraupen	Pyrinex	3 l/ha	14		

13. Schnittlauch

	Unkräuter und Ungräser	Ramrod flowable	9,5-11 l/ha		Sofort nach der Saat. Vor dem Auflaufen der Unkräuter.
	Ungräser, Ausfallgetreide, Quecke	Focus Ultra	2-3 l/ha 5-6 l/ha		Gegen Ungräser und Ausfallgetreide. Gegen Quecke (ca. 20 cm hoch). Behandlung ab 2-Blatt-Stadium der Kultur. Nur im Anzuchtjahr.
	Samtfleckenkrankheit	Bogard	0,5 l/ha	14	Maximal 4 Behandlungen pro Jahr. Behandlung bis 1 Woche nach dem Schnitt.
	Erdflöhe, Erdraupen	Fastac Perlen	70 g/ha	14	
	Lauchminiermotte, Thrips	Diazinon flüssig	1 l/ha	14	Zur Thripsbekämpfung jedes Mal das Mittel wechseln und Netzmittel resp. bei reduzierten Wassermengen Silwet L-77 beimischen.
		Pyrinex	1 l/ha	14	
Begrünung der Röhren	Micro-Fe	1 l/ha		Behandlungen wiederholen, falls notwendig.	