

WF = Wartefrist in Tagen

14. Spargeln



Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.

Herbizid in Junganlagen	Stomp 400 SC	2,5–4 l/ha		7-10 Tage nach der Pflanzung. Im Frühjahr vor dem Durchstossen.
Ungräser, Einj. Rispengras	Aramo	2 l/ha		Nach der Ernte, nur 1 Anwendung pro Jahr.
Blattschwärze	Rover Star	4 l/ha		Nach der Ernte Laub sehr gut benetzen.
Botrytis, Spargelrost, Blattschwärze (Stemphylium)	Stroby	500 g/ha		Nach der Ernte, bei Befallsbeginn. Behandlung wiederholen.
Blattschwärze, Rostpilze	Bogard	0,5 l/ha		Im Sommer. Maximal 4 Behandlungen pro Jahr.
Spargelkäfer, Spargelhähnchen	Fastac Perlen	70 g/ha	14	Wartefrist gilt nur für direkt behandelte Pflanzenteile.
Schnecken	Antischneck-Feinkorn oder Epanex	5-10 kg/ha		Ab Beginn Durchstossen streuen.

15. Spinat



Herbizid vor dem Auflaufen Winterspinat	Lenacil	1,5–2 kg/ha		In sehr humosen Böden höhere Dosierung.
Frühling-, Sommer- und Herbstspinat	Epilan	1,5 l/ha		In Mineralböden (Winterspinat nicht behandeln).
Nachauflauf	Betam	1–2 l/ha od. 2 x 1 l/ha Split	21	Im Keimblattstadium der Unkräuter. Nicht bei extremer Witterung behandeln.
Falscher Mehltau	Mancozeb 80 + Forum	2 kg/ha 1 l/ha	14	2 Behandlungen ab Keimblattstadium. Sommerspinat.
Falscher Mehltau, Septoria	Ridomil Gold + Forum	2 kg/ha 1 l/ha	21 14	Winterspinat. Sommerspinat. Winterspinat.
Rübenfliege	Diazinon flüssig	1 l/ha	14	
Blattfressende Raupen, Blattläuse, Thripse	Lannate 25 WP NEU	1,5 kg/ha	14	
Eulenraupen	Pyrinex	3 l/ha	14	
Blattfressende Raupen, Erdräupen	Fastac Perlen	70 g/ha	7	
Blattvergilbung	Fetrilon-Combi	2 kg/ha		Ab 4–6-Blatt-Stadium. Speziell später Frühlings- und Herbstspinat.
Wachstumsförderung	Folifert Super	3–5 kg/ha		Pflanzenverträglicher Blattdünger.