

WF = Wartefrist in Tagen

17. Zwiebeln

Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.



A) Steckzwiebeln	Linuron LG	2–3 kg/ha		Vor dem Auflaufen der Steckzwiebeln. Zwiebeln müssen mit Erde bedeckt sein. Vor dem Auflaufen der Unkräuter. In leichten Böden untere Dosierung.	
	Ramrod flowable + Stomp 400 SC	8–9 l/ha 2–3 l/ha			
B) Saatzzwiebeln	Reglone + Herbizid-Öl	3 l/ha 1 l/ha			Vor dem Auflaufen der Saatzzwiebeln. Die Zwiebelkeimlinge dürfen noch nicht sichtbar sein. Vor dem Auflaufen der Unkräuter oder sofort nach der Reglone-Behandlung. In leichten Böden untere Dosierung.
	Ramrod flowable + Stomp 400 SC	8–9 l/ha 1–1,5 l/ha			
Ungräser, Ausfallgetreide, Quecke	Focus Ultra	2–6 l/ha	56		5–6 l/ha gegen Quecke (ca. 20 cm hoch).
Ungräser, Einj. Rispengras	Aramo	2 l/ha	28		Nur eine Anwendung pro Jahr.
Stengelälchen	Carbofuran	1,3 g/lfm/Reihe			Bei der Saat. Bei Insektiziden und Fungiziden Netzmittel zusetzen.
Thrips	Lannate 25 WP NEU	1,5 kg/ha	14		Zu beachten bei Thripsbehandlungen: a) Behandlung nach 1 Woche wiederholen. b) Jedes Mal das Mittel wechseln.
	Perfekthion	0,6 l/ha	21		
	Pyrinex	3 l/ha	14		
Thrips, Lauchmotte	Diazinon flüssig	1 l/ha	14		
Minierfliege, Thrips	Fastac Perlen	70 g/ha	14		
Zwiebelfliege	Birlane flüssig	0,2 % / 2,5 dl/lfm		Giessen, wenn nötig im 2-4 Blattstadium der Zwiebeln.	
Zwiebelmehltau	Rover Star + Forum	4 l/ha 1 l/ha	21	Gründlich von beiden Seiten spritzen. In Kombination mit teilsystemischer Wirkung.	
	Acrobat MZ WG	2,5 kg/ha	14		
Purpurflecken, Rostpilze, Samtfleckenkrankheit	Ridomil Gold	2,5–3 kg/ha	21	Behandlung nach 1 Woche wiederholen. Maximal 4 Behandlungen pro Jahr.	
	Bogard	0,5 l/ha	14		
Spurenelementmangel	Fetrilon-Combi	1 kg/ha		Der Spritzbrühe beifügen.	
Wachstumsförderung	Folifert Super	2–4 kg/ha		Als Zusatz zu Fungizid- oder Insektizid-spritzungen.	