





















Beerenobst

	Brombeeren	Himbeeren	Johannisbeeren	Stachelbeeren	Produkt	Anwendung	Hinweise
	•	•	•	•	Silwet L-77 	0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.	
Herbizid	•	•	•	•	Reglone	40 ml/a	Abbrennen der Unkräuter.
			•		Sprion G	20-40 kg/ha	Vor Austrieb.
Blattläuse, Frostspanner, Schildläuse, Gallmilben			•	•	Oleo Diazinon R 	0,5 %	Kurz vor dem Austrieb gründlich spritzen.
Brombeermilbe	•				Netzschwefel 	2 % 1 %	Kurz vor dem Austrieb. Als 2. Behandlung bei starkem Befall nach Austrieb, bei 15-20 cm Trieblänge.
Blütenstecher, Himberkäfer		•			Pyrinex  Fastac Perlen 	0,3 % 0,01 %	Bis Blüte, Wartefrist: 3 Wochen.
Blattläuse	•	•	•	•	Pirimor 	0,04 %	Wartefrist: 3 Wochen.
Himbeerrindengallmücke		•			Diazinon flüssig 	0,1 %	Wartefrist: 3 Wochen. Jungtriebe 30-40 cm lang.
Spinnmilben (Eier + Larven)	•	•	•	•	Matacar 	0,05 %	Matacar, Trevi, Apollo nur 1 mal pro Saison einsetzen. Vor der Blüte oder nach der Ernte.
Blattläuse, Frostspanner, Gemeine Kommaschildlaus, Knospenwickler, Napfschildläuse			•	•	Diazinon flüssig 	0,1 %	Wartefrist: 3 Wochen.
	•	•	•	•	<i>Einsatz von Nutzinsekten siehe Einsatzplan Seite 79 oder fragen Sie den örtlichen LG-Berater.</i>		
Rost		•			Bogard 	0,5 l/ha	Vor der Blüte und nach der Ernte.
Echter Mehltau			•	•	Bogard 	0,5 l/ha	Vor der Blüte und nach der Ernte.
			•		Nimrod 	0,1 %	Wartefrist: 2 Wochen. Maximal 5 Behandlungen im Abstand von 2 Wochen.
Falscher Mehltau	•				Forum Star 	0,125 %	Wartefrist: 3 Wochen. Maximal 3 Behandlungen nach der Blüte.
Falscher Mehltau, Mycospherella	•				Ridomil Gold 	0,25-0,5 %	Wartefrist: 3 Wochen.
Wurzelsterben		•			Ridomil Gold 	0,25-0,5 %	40 - 50 cm breit giessen.
Echter Mehltau			•	•	Stroby 	0,03 %	Wartefrist: 3 Wochen.
Echter Mehltau, Mondscheinigkeit			•		Stroby 	0,03 %	Maximal 3 Anwendungen pro Jahr.
Mondscheinigkeit			•		Delan 	0,5-0,75 %	Vor Austrieb bis zur Blüte.
Rutenkrankheit	•	•			Cuproxat flüssig 	0,5-1 % oder	Wenn Neuaustriebe 20 cm lang sind sowie kurz vor der Blüte und nach der Ernte.
					Flowbrix 	0,25 -0,5 %	Wartefrist: 3 Woche. Hochwertiges Kupferpräparat.
Blattfallkrankheit			•	•	Cuproxat flüssig 	0,25-0,75 % oder	Wartefrist: 3 Wochen. Unmittelbar nach der Blüte und nach der Ernte.
					Flowbrix 	0,15-0,4 %	Hochwertiges Kupferpräparat.
Eisenmangel	•	•	•	•	Ferplus Top 	0,3-0,7 kg/a	Ausgangs Winter streuen und einarbeiten.
Wachstumsförderung	•	•	•	•	Folifert Super	0,4-0,5 %	2 Behandlungen vor der Blüte